Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Acetilsalicilskābe Stirol 325 mg tabletes
acidum acetylsalicylicum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja Jūs lietojiet Acetilsalicilskābe Stirol kā pretiekaisuma, pretsāpju vai pretdrudža līdzekli un pēc 3-5 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Acetilsalicilskābe Stirol un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Acetilsalicilskābe Stirol lietošanas
3. Kā lietot Acetilsalicilskābe Stirol
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Acetilsalicilskābe Stirol
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Acetilsalicilskābe Stirol un kādam nolūkam to lieto

Acetilsalicilskābe darbojas kā pretiekaisuma, analgētiskais un pretdrudža līdzeklis, kā arī kavē trombocītu agregāciju. Darbības mehānisms saistīts ar arahidonskābes, kas ir prostaglandīnu priekštecis un kam piemīt galvenā loma iekaisuma, sāpju un drudža patoģenēzē, metabolisma galvenā fermenta – ciklooksigenāzes aktivitātes nomākšanu.

Lieto kā pretsāpju līdzekli vāji vai mēreni izteikta sāpju sindroma gadījumos, temperatūras pazeminināšanai drudža laikā. Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Lieto arī trombocītu agregācijas kavēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Acetilsalicilskābe Stirol lietošanas

Nelietojiet Acetilsalicilskābe Stirol šādos gadījumos:
- ja Jums ir alerģija pret acetilsalicilskābi, salicilātiem, citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu (ja anamnēzē ir norādes uz bronhu spazmām, nātreni, rinītu vai astmu, ko izraisa acetilsalicilskābes, salicilātu vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana);
- ja Jums ir kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla;
- ja Jums ir hemorāģiskā diatēze (asins izplūdumi ādā, zemādā), hemofīlija, asinsreces traucējumi;
- ja Jums ir izteikti aknu un/vai nieru funkcijas traucējumi;
- kombinācijā ar metotreksātu devās pa 15 mg/nedēļā vai vairāk.

Kontrindicēts bērniem līdz 16 gadu vecumam drudža un vīrusu infekciju gadījumā, kā arī grūtniecības un krūts barošanas laikā.

Zāles nav ieteicamas podagras ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Acetilsalicilskābe Stirol, nepieciešama šādos gadījumos:

- ja Jums ir bronhiālā astma;
- ja Jums ir alerģiskas slimības;
- ja Jūs vienlaikus lietojiet citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, tai skaitā ciklooksigenāzes-2 selektīvos inhibitorus;
- ja Jums ir nieru un/vai aknu funkciju traucējumi;
- ja Jums ir nekontrolēta arteriāla hipertensija;
- ja Jums ir glikozes-6-fosfātdehidrogenāzes deficīts;
- acetilsalicilskābes lietošana jāpārtrauc 10 dienas pirms ķirurģiskām manipulācijām (ieskaitot nelielas operācijas, piemēram, zoba ekstrakciju);
- vecāka gadagājuma pacientiem.

Acetilsalicilskābe piesardzīgi jālieto pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto antikoagulantus.

Acetilsalicilskābe pat nelielā devā mazina urīnskābes izdali, kas var būt par iemeslu akūtas podagras lēkmei pacientam ar noslieci. Ilgstošas terapijas un/vai acetilsalicilskābes lietošanas augstās devās gadījumā nepieciešama ārsta uzraudzība un regulāra hemoglobīna līmeņa kontrole.

Acetilsalicilskābe piesardzīgi jālieto pacientiem ar organisma atūdeņošanos.

Piesardzība jāievēro, ja anamnēzē ir kuņģa un zarnu čūlas, ieskaitot hroniskas čūlas vai periodiskus čūlas paasinājumus, vai arī kuņģa un zarnu asiņošana.

Acetilsalicilskābe var izraisīt aknu bojājumu, īpaši pacientiem ar juvenīlo idiopātisko artrītu.

Bērniem acetilsalicilskābe ir kontrindicēta drudža un vīrusu infekcijas gadījumā Reja sindroma iespējamības dēļ. Reja sindroms ir ļoti reta, bet bīstama blakusparādība, par kuru var liecināt sekojošas pazīmes: apātija, miegainība, sāpes vēderā, nemitīga vemšana, agresivitāte, krampji un koma. Lietošana bērniem pieļaujama tikai pēc ārsta norādījuma gadījumos, ja citi pasākumi bijuši neefektīvi, vai juvenīlā artrīta ārstēšanai. Pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam jāizvairās no acetilsalicilskābes lietošanas drudža un vīrusu infekciju gadījumos.

Pirms Acetilsalicilskābe Stirol lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Acetilsalicilskābe Stirol
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Dažas citas zāles var ietekmēt acetilsalicilskābes lietošanu un otrādi.

Ja vien ārsts nav norādījis citādi, šīs zāles nevajadzētu lietot vienlaikus ar: citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, antikoagulantiem (heparīnu, kumarīnu), tiklopidīnu, urikozūriskiem līdzekļiem (zāles, ko lieto podagras ārstēšanai), pretdiabēta līdzekļiem, glikokortikoīdiem, diurētiskajiem līdzekļiem, AKE inhibitoriem, angiotenzīna II receptoru antagonistiem, digoksīnu, pentoksifilīnu, trombolītiskajiem līdzekļiem, mifepristonu, iloprostu, cilostazolu, antacīdiem, sulfanilamīdiem, antidepresantiem (SSAI), pretepilepsijas līdzekļiem, centrālās darbības zālēm aptaukošanās ārstēšanai, α-interferonu, zafirlukastu, metotreksātu.

Eksperimentālie dati liecina, ka ibuprofēns, iespējams, samazina acetilsalicilskābes antitrombotisko darbību, ja tos lieto vienlaikus. Tomēr, tā kā šo datu ir maz un pastāv neskaidrība par šo datu attiecinājumu uz klīnsikajiem gadījumiem, šobrīd netiek uzskatīts, ka neregulāra ibuprofēna lietošana ietekmē acetilsalicilskābes antitrombotisko darbību.

Ja Jūs regulāri lietojiet acetilsalicilskābi, pirms citu zāļu lietošanas (arī kuras var iegādāties bez receptes) konsultējieties ar ārstu.

Acetilsalicilskābe Stirol kopā ar alkoholu
Vienlaicīga alkohola lietošana palielina kuņģa un zarnu trakta gļotādas bojājuma un asiņošanas risku savstarpējās papildus iedarbības dēļ.

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības laikā (īpaši tās pēdējā trimestrī) acetilsalicilskābes lietošana ir kontrindicēta.

Bērna zīdīšanas laikā acetilsalicilskābi nedrīkst lietot, jo tā nokļūst mātes pienā un pastāv Reja sindroma attīstības risks.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Acetilsalicilskābe Stirol parasti neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot tehniskās iekārtas.

Acetilsalicilskābe Stirol satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".

3. Kā lietot Acetilsalicilskābe Stirol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tabletes lieto iekšķīgi pēc ēšanas.
Vājas un vidējas intensitātes sāpju sindroma un drudža gadījumos acetilsalicilskābes devas pieaugušajiem – pa 1-2 tabletēm 3-4 reizes dienā ar ne mazāk kā 4 stundu intervālu; maksimālā diennakts deva – 4 g. Ārstēšanas kursa ilgums ir atkarīgs no terapijas efektivitātes. Zāles bez ārsta konsultācijas nedrīkst lietot ilgāk par 3 – 5 dienām.
Kā antitrombotisku līdzekli pieaugušie lieto pa ½ līdz 1 tabletei dienā stingrā ārsta uzraudzībā. Ārstēšanas ilgumu katrā gadījumā nosaka individuāli.

Tabletes lieto iekšķīgi pēc ēšanas.
Tableti var sadalīt divās vienādās devās.

Ja esat lietojis Acetilsalicilskābe Stirol vairāk nekā noteikts
Acetilsalicilskābes hroniska pārdozēšana (lielās devās), kad pārsvarā rodas centrālās nervu sistēmas traucējumi, atšķiras no akūtas saindēšanās, kuras gadījumā galvenie ir skābju-sārmu līdzsvara traucējumi.
Pārdozēšanas vai saindēšanās simptomi: izsitumi, troksnis ausīs, slikta dūša, vemšana, redzes un dzirdes traucējumi, galvassāpes, reibonis, apjukuma stāvokļi. Smagas saindēšanās gadījumā var rasties delīrijs, trīce, elpas trūkums, svīšana, eksikoze, hipertermija un koma.
Pārdozēšanas gadījumā griezties pēc ārsta palīdzības.

Ja esat aizmirsis lietot Acetilsalicilskābe Stirol
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamajām blakusparādībām var būt noteikts biežums, kas definēts šādi: ļoti bieži: rodas vairāk nekā 1 no 10 zāļu lietotājiem, bieži: rodas 1 līdz 10 no 100 zāļu lietotājiem, retāk: rodas 1 līdz 10 no 1000 zāļu lietotājiem, reti: rodas 1 līdz 10 no 10 000 zāļu lietotājiem, ļoti reti: rodas mazāk nekā 1 no 10 000 zāļu lietotājiem, nav zināms: pēc pieejamiem datiem biežumu nevar noteikt.

Imūnās sistēmas traucējumi: dažiem slimniekiem var novērot alerģiskas un ādas reakcijas, bronhu spazmas, nātreni.

Sirds funkcijas un asinsvadu sistēmas traucējumi: nebūtiska īslaicīga arteriālā asinsspiediena paaugstināšanās, tahikardija, kas pāriet, pārtraucot zāļu lietošanu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: iespējamas sekojošas blakusparādības: bieži – dedzināšana, kuņģa-zarnu trakta un vēdera sāpes, retāk - slikta dūša, vemšana, apetītes trūkums, sāpes epigastrijā, caureja; reti – erozīvi-čūlaini bojājumi, asiņošana no kuņģa-zarnu trakta, kuņģa un zarnu trakta kairinājums ar nelielu asimptomātisku asins zudumu.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi: ļoti reti - aknu funkciju traucējumi, aknu bojājums.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: pagarināts tecēšanas laiks, reti – trombocitopēnija (kas nozīmē trombocītu skaita samazināšanos asinīs), anēmija (eritrocītu skaita samazināšanās asinīs). Ļoti reti ziņots par olbaltumvielu daudzuma samazināšanos asinīs (pie lielām devām).

Nieru un urīna izvades sistēmas traucējumi: nieru funkciju traucējumi.

Nervu sistēmas traucējumi: ļoti reti ziņojumi par apjukumu.

Acu bojājumi: atgriezeniski redzes traucējumi.

Ausu un labirinta bojājumi: reti - troksnis ausīs, ļoti reti – dzirdes traucējumi, reibonis.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: ilgstošas lietošanas gadījumā iespējamas galvassāpes.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zaļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Acetilsalicilskābe Stirol

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Sargāt no mitruma un gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet Acetilsalicilskābe Stirol pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Acetilsalicilskābe Stirol satur
- Aktīvā viela ir acetilsalicilskābe.
  Katra tablete satur 325 mg acetilsalicilskābes.
- Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, stearīnskābe.

Acetilsalicilskābe Stirol ārējais izskats un iepakojums
Baltas ieapaļas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt divās vienādās devās.

10 vai 12 tabletes polivinilhlorīda plēves un alumīnija folijas blisterī. Iepakojumā pievienota lietošanas instrukcija.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Stirolbiofarm Baltikum SIA
Meža prospekts 27 - 19, Jūrmala, LV-2010, Latvija

Ražotājs
MARIFARM d.o.o.
Minarikova ulica 8, Maribor, 2000, Slovēnija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2024.gada martā.