

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ubichinon compositum šķīdums injekcijām

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabāiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiņiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
- Ja pēc 4 nedēļām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzināt:

1. Kas ir Ubichinon compositum un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Ubichinon compositum lietošanas
3. Kā lietot Ubichinon compositum
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Ubichinon compositum
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ubichinon compositum un kādam nolūkam to lieto

Ubichinon compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto organisma aizsargsistēmas mehānismu aktivēšanai pret toksīniem, lai atjaunotu bloķēto fermentu sistēmu darbību to funkciju traucējumu un deģeneratīvu slimību gadījumā (šūnu līmenī).

2. Kas Jums jāzina pirms Ubichinon compositum lietošanas

Nelietojiet Ubichinon compositum šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
- grūtniecības un barošanas ar krūti periodā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ubichinon compositum lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja simptomi saglabājas vai stāvoklis pasliktinās, konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Bērni

Ubichinon compositum drošums un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Pirms Ubichinon compositum lietošanas bērniem līdz 12 gadu vecumam, konsultējieties ar ārstu.

Citas zāles un Ubichinon compositum

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ubichinon compositum neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ubichinon compositum satur etilspirtu

Šīs zāles satur 2,5 mg etilspirta (alkohola) katrā ampulā (0,1% w/w).

Šo zāļu daudzums vienā ampulā ir līdzvērtīgi mazāk kā 1 ml alus vai 1 ml vīna.

Nelielais alkohola daudzums zālēs neizraisīs ievērojamu ietekmi

Ubichinon compositum satur nātriju

Šīs zāles satur 17,6 mg nātrija vienā ampulā. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) dienas devā. Būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Ubichinon compositum

Šķīdums injekcijām intramuskulārai, subkutānai vai intradermālai lietošanai.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums ir teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiņiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Injicēt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā.



Gados veciem cilvēkiem, aknu vai nieru bojājumu gadījumos nav nepieciešama īpaša devas pielāgošana.

Lietošanas veids

Ubichinon compositum var ievadīt intramuskulāri, subkutāni vai intradermāli.

Intradermālas injekcijas gadījumā 1 ampulas saturu ievada nelielos daudzumos pa 0,1 līdz 0,2 ml vairākās vietās.

Norādījumi stikla ampulas atvēršanai:



Rīkotos uzmanīgi. Ievērojiet atvēršanas instrukciju. Stikla ampulas atgriešana nav nepieciešama. Turiet ampulas galviņu uz augšu leņķī un piesitiet/kratiet ampulas galviņā esošo šķīdumu. Pēc tam nolauziet ampulas galviņu, spiežot to prom no krāsas punkta. Atlikušais ampulas saturs jāiznīcina.

Ja esat lietojis Ubichinon compositum vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Ubichinon compositum

Nelietot dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pātraucat lietot Ubichinon compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiņiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (sastop retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piemēram, ādas alerģiskās reakcijas, piesārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ubichinon compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu etiķetes pēc "Derīgs līdz:". Derīguma termiņš attiecas un norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija**Ko Ubichinon compositum satur**

- Katra 2,2 ml (= 2,2 g) ampula satur aktīvās vielas:

Ubidecarenonum D10 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Vaccinium myrtillus D4 22 mg, Colchicum autumnale D4 22 mg, Podophyllum peltatum D4 22 mg, Conium maculatum D4 22 mg, Hydrastis canadensis D4 22 mg, Acidum L(+)-lacticum D6 22 mg, Hydrochinonum D8 22 mg, Acidum DL-alpha liponicum D8 22 mg, Sulfur D8 22 mg, Manganum phosphoricum D8 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 mg, Trichinoylum D10 22 mg, Anthrachinonum D10 22 mg, Naphthochinonum D10 22 mg, para-Benzochinonum D10 22 mg, Adenosinum triphosphoricum D10 22 mg, Coenzymum A D10 22 mg, Galium aparine D6 22 mg, Acidum acetylsalicylicum D10 22 mg, Histaminum D10 22 mg, Nadidum D10 22 mg, Magnesium gluconicum D10 22 mg.

- Citas sastāvdaļas ir: nātrijs hlorīds, ūdens injekcijām.

Ubichinon compositum ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā pa 10 vai 100 stikla ampulām (I klase), pa 2,2 ml katrā ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2022