SASKAŅOTS ZVA 30-05-2023

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Arisppa 10 mg tabletes
Arisppa 15 mg tabletes
aripiprazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Arisppa un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Arisppa lietošanas
3. Kā lietot Arisppa
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Arisppa
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Arisppa un kādam nolūkam to lieto

Arisppa sastāvā esošā aktīvā viela ir aripiprazols, un tās ir antipsihotisko līdzekļu grupas zāles. Tās lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 15 gadu vecuma, kuriem ir slimība ar šādiem raksturīgiem simptomiem, piemēram, dzird, redz vai jūt lietas, kuru patiesībā tur nav; aizdomīgums, maldīgi priekšstati, nesakarīga runa vai uzvedība un emocionāls seklums. Cilvēki ar šādu stāvokli var izjust arī depresiju, vainas apziņu, trauksmi vai sasprindzinājumu.

Arisppa lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 13 gadu vecuma, kuriem ir tādi simptomi kā, piemēram, pārspīlēti pacilāts garastāvoklis, pārmērīgs enerģijas daudzums, miegam nepieciešams mazāk stundu nekā parasti, ātra runa un "ātras", trauksmainas idejas, paaugstināta aizkaitināmība. Šīs zāles palīdz pieaugušiem pacientiem, kuri veiksmīgi ārstējušies ar Arisppa, neatgriezties iepriekšējā stāvoklī.

2. Kas Jums jāzina pirms Arisppa lietošanas

Nelietojiet Arisppa šādos gadījumos
- ja Jums ir alerģija pret aripiprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Arisppa lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ārstēšanas ar aripiprazolu laikā ir ziņots par pašnāvnieciskām domām un rīcību. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas domas vai sajūtas, ka Jūs varētu nodarīt sev ļaunu.

Pirms Arisppa lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir
- augsts cukura līmenis asinīs (ar tādiem simptomiem kā pārmērīgas slāpes, urīna daudzuma palielināšanās, apetītes pieaugums un vājuma sajūta) vai cukura diabēts ģimenes anamnēzē;
- krampju lēkmes, jo tādā gadījumā ārstam vajadzētu Jūs pastiprināti novērot;
- netīšas, neregulāras muskuļu kustības, sevišķi sejā;
- sirds un asinsvadu slimības, sirds un asinsvadu slimības ģimenes anamnēzē, insults vai "mini" insults, izmainīts asinsspiediens;

- asins recekļi vai to esamība ģimenes anamnēzē, jo asins recekļu veidošanos saista ar antipsihotisko līdzekļu lietošanu;
- iepriekš ir bijusi pārmērīga tieksme uz azartspēlēm.

Ja Jūs novērojat ķermeņa masas pieaugumu, neparastu kustību attīstību, miegainību, kas traucē veikt ikdienas darbus, vai jebkādas rīšanas grūtības, vai alerģiskus simptomus, lūdzu informējiet ārstu.

Ja Jūs esat gados vecāks pacients, kurš slimo ar demenci (atmiņas vai citu garīgu spēju zudums) vai kuram kādreiz bijis insults vai mikroinsults, tad Jums vai Jūsu piederīgajiem, vai aprūpētājam tas jāpaziņo ārstam.
Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir domas vai sajūtas, kas liek darīt sev pāri. Ārstēšanas ar aripiprazolu laikā ir ziņots par pašnāvnieciskām domām un rīcību.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir muskuļu stīvums vai nekustīgums ar augstu temperatūru, svīšanu, nestabilu garīgo stāvokli vai ļoti ātra vai neregulāra sirdsdarbība.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās tieksmes vai kāre uzvesties sev neierastā veidā un Jūs nevarat pretoties impulsam, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas var kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šāda uzvedība tiek saukta par impulsu kontroles traucējumiem, un tā var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, anormāli augsta dzimumtieksme vai uzmācīgas seksuālas domas vai jūtas.
Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot Jūsu zāļu devu vai pārtraukt zāļu lietošanu.

Aripiprazols var izraisīt miegainību, asinsspiediena pazemināšanos, pieceļoties stāvus, reiboni un izmaiņas spējā kustēties un noturēt līdzsvaru, kā rezultātā ir iespējama krišana. Jāievēro piesardzība, īpaši tad, ja esat gados vecāks pacients vai Jums ir novājināts organisms.

Bērni un pusaudži
Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 13 gadu vecumu. Nav zināms, vai šo zāļu lietošana šiem pacientiem ir droša un efektīva.

Citas zāles un Arisppa
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp arī par bezrecepšu zālēm.

Asinsspiedienu pazeminošas zāles: Arisppa tabletes var pastiprināt asinsspiedienu pazeminošo zāļu efektu. Katrā ziņā informējiet ārstu, ja lietojat zāles asinsspiediena regulēšanai.

Lietojot Arisppa tabletes kopā ar dažām zālēm, ārstam var būt nepieciešams mainīt Arisppa vai citu zāļu devu. Īpaši nepieciešams pieminēt Jūsu ārstam sekojošas zāles:
- zāles sirds ritma korekcijai (piemēram, hinidīns, amiodarons, flekainīds);
- antidepresantus vai augu valsts līdzekļus depresijas un trauksmes ārstēšanai (piemēram, fluoksetīns, paroksetīns, venlafaksīns, asinszāle);
- pretsēnīšu līdzekļus (piemēram, ketokonazols, itrakonazols);
- noteiktas zāles HIV infekcijas ārstēšanai (piemēram, efivarenzs, nevirapīns, proteāzes inhibitori, kā indinavīrs, ritonavīrs);
- pretkrampju zāles, ko lieto, lai ārstētu epilepsiju (piemēram, karbamazepīns, fenitoīns, fenobarbitāls);
- noteiktas antibiotikas, kuras lieto tuberkulozes ārstēšanai (rifabutīns, rifampicīns).

Šīs zāles var palielināt blakusparādību risku vai pavājināt Arisppa iedarbību; ja, lietojot šīs zāles kopā ar Arisppa, Jums rodas kādi neparasti simptomi, Jums ir jāapmeklē ārsts.

Zāles, kuras paaugstina serotonīna līmeni, parasti tiek lietotas depresijas, ģeneralizētas trauksmes, obsesīvi kompulsīvo traucējumu (OKT) un sociālās fobijas, kā arī migrēnas un sāpju ārstēšanā:
- triptāni, tramadols un triptofāns tiek lietoti šādos gadījumos, kā depresijas, ģeneralizētas

trauksmes, obsesīvi kompulsīvo traucējumu (OKT) un sociālās fobijas, kā arī migrēnas un sāpju ārstēšanā;
- selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (SSAI) (piemēram, paroksetīns un fluoksetīns) depresijas, OKT, panikas un trauksmes ārstēšanai;
- citi antidepresanti (piemēram, venlafaksīns un triptofāns) smagas depresijas ārstēšanai;
- tricikliskie līdzekļi (piemēram, klomipramīns un amitriptilīns) depresīvu slimību ārstēšanai;
- asinszāle (*Hypericum perforatum*) kā augu izcelsmes preparāts depresijas vieglās formas ārstēšanai;
- pretsāpju līdzekļi (piemēram, tramadols un petidīns) sāpju mazināšanai;
- triptāni (piemēram, sumatriptāns un zolmitriptāns) migrēnas ārstēšanai.

Šīs zāles var palielināt blakusparādību risku; ja, lietojot jebkuras šīs zāles vienlaicīgi ar Arisppa, Jums rodas jebkādi neparasti simptomi, Jums ir jāvēršas pie ārsta.

Arisppa kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu
Šīs zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.
Ir jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas aripiprazolu pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams, Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Ja lietojat Arisppa, Jūsu ārsts, ņemot vērā ieguvumu Jums no ārstēšanas un ieguvumu mazulim no barošanas ar krūti, apspriedīs ar Jums, vai barot mazuli ar krūti. Nedrīkst vienlaicīgi ārstēties un barot ar krūti. Ja lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu par labāko veidu, kā barot savu mazuli.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Šo zāļu lietošanas laikā ir iespējams reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4. punktu). Tas jāņem vērā gadījumos, kad ir nepieciešams saglabāt modrību, piemēram, vadot transportlīdzekli vai rīkojoties ar mehānismiem.

Arisppa satur laktozi
Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Arisppa

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir 15 mg vienu reizi dienā. Ārsts var parakstīt Jums mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem
Arisppa ārstēšanu var uzsākt ar mazu devu, lietojot šķidro zāļu formu - šķīdumu iekšķīgai lietošanai. Devu pakāpeniski palielina, līdz tiek sasniegta **ieteicamā deva pusaudžiem – 10 mg vienu reizi dienā**. Tomēr ārsts var parakstīt Jums mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Atbilstošā Arisppa zāļu forma (piemēram, 1 mg/ml šķīdums) nav pieejama. Jāizmanto alternatīvas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu.

Ja Jums liekas, ka Arisppa iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Centieties iedzert Arisppa katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Tam nav nozīmes, vai lietojat šīs zāles ar ēdienu vai tukšā dūšā. Tablete vienmēr jānorij vesela, uzdzerot ūdeni.

Pat ja Jūs jūtaties labāk, nemainiet Arisppa devu un nepārtrauciet tā lietošanu bez ārsta konsultācijas.

Ja esat lietojis Arisppa vairāk nekā noteikts
Ja Jūs aptvērāt, ka esat lietojis vairāk Arisppa nekā ārsts to ieteica (vai kāds cits ir lietojis Jūsu Arisppa), tūlīt paziņojiet to savam ārstam. Ja tas nav iespējams, jāgriežas tuvākajā slimnīcā, ņemot līdzi iepakojumu.

Pacientiem, kas ir lietojuši pārāk daudz aripiprazola, ir bijuši šādi simptomi:
- strauja sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, runas problēmas;
- neparastas kustības (jo īpaši sejas vai mēles kustības) un apziņas traucējumi.

Citi simptomi var būt:
- akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma, drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas kombinācija;
- muskuļu stīvums un vājums vai miegainība, palēnināta elpošana, smakšana, augsts vai zems asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, ja Jūs konstatējat jebko no iepriekš minētā.

Ja esat aizmirsis lietot Arisppa
Ja aizmirsāt lietot zāļu devu, lietojiet izlaisto devu, tiklīdz Jūs to atceraties, bet nelietojiet divas devas vienā dienā.

Ja pārtraucat lietot Arisppa
Nepārtrauciet ārstēšanos tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt lietot Arisppa tik ilgi, cik to ir noteicis ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 10 cilvēkiem):

- cukura diabēts,
- miega traucējumi,
- trauksmes sajūta,
- nemierīguma sajūta un nespēja saglabāt mieru, grūtības mierīgi nosēdēt,
- akatīzija (nepatīkama iekšēja nemiera sajūta un nepārvarama nepieciešamība nepārtraukti pārvietoties),
- nekontrolējamas kustības (raustīšanās vai locīšanās),
- trīce,
- galvassāpes,
- nogurums,
- miegainība,
- ģībšanas sajūta,
- drebuļi un redzes miglošanās,

- retāka vai apgrūtināta vēdera izeja,
- gremošanas traucējumi,
- slikta dūša,
- lielāks siekalu daudzums mutē nekā parasti,
- vemšana,
- noguruma sajūta.

Retāk novērojamas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 cilvēkiem):

- paaugstināta vai pazemināta prolaktīna (hormons) koncentrācija asinīs,
- pārlieks cukura daudzums asinīs,
- depresija,
- izmainīta vai pastiprināta seksuālā dziņa,
- nekontrolējamas mutes, mēles vai locekļu kustības (tardīvā diskinēzija),
- kustību īpatnības izraisoši muskuļu darbības traucējumi (distonija),
- nemierīgo kāju sindroms,
- redzes dubultošanās,
- acs jutība pret gaismu,
- ātra sirdsdarbība,
- asinsspiediena krišanās pieceļoties, kas izraisa reiboni, ģībšanas sajūtu vai samaņas zudumu,
- žagas.

Pēc Arisppa reģistrācijas tika novērotas šādas nevēlamas blakusparādības, bet to parādīšanās biežums nav zināms:

- mazs balto asinsķermenīšu skaits,
- mazs trombocītu skaits,
- alerģiskas reakcijas (piemēram, pietūkums mutē, mēlē, sejā un rīklē, nieze, nātrene),
- cukura diabēta saasināšanās vai rašanās, ketoacidoze (ketonvielas asinīs un urīnā) vai koma,
- palielināts cukura daudzums asinīs,
- nepietiekams nātrija daudzums asinīs,
- apetītes zudums (anoreksija),
- ķermeņa masas samazināšanās,
- ķermeņa masas pieaugums,
- pašnāvības domas, pašnāvības mēģinājumi un pašnāvība,
- agresivitāte,
- uzbudinājums,
- nervozitāte,
- kombinācijā drudzis, muskuļu stīvums, paātrināta elpošana, svīšana, apziņas traucējumi un pēkšņas asinsspiediena un sirdsdarbības izmaiņas, samaņas zudums (ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms),
- krampji,
- serotonīna sindroms (reakcija, kas var izraisīt lielas laimes sajūtu, miegainību, neveiklumu, nemieru, apreibuma sajūtu, drudzi, svīšanu vai muskuļu stīvumu),
- runas traucējumi,
- acu ābolu fiksācija vienā pozīcijā,
- pēkšņa, neizskaidrojama nāve,
- dzīvībai bīstami neregulāra sirdsdarbība,
- sirdslēkme,
- palēnināta sirdsdarbība,
- asins recekļi vēnās, sevišķi kāju vēnās (var būt simptomi kā pietūkums, sāpes un apsārtums), kuri pa asinsvadiem var nokļūt plaušās, radot sāpes krūtīs un grūtības elpot (ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties lūdziet medicīnisko palīdzību),
- augsts asinsspiediens,
- samaņas zudums,
- nejauša ēdiena ieelpošana ar pneimonijas (plaušu infekcijas) risku,

- muskuļu spazmas balsenes rajonā,
- aizkuņģa dziedzera iekaisums,
- rīšanas grūtības,
- caureja,
- diskomforta sajūta vēderā,
- diskomforta sajūta kuņģī,
- aknu mazspēja,
- aknu iekaisums,
- ādas un acu baltumu dzelte,
- ziņojumi par patoloģiskiem aknu testu rādītājiem,
- ādas izsitumi,
- ādas jutīgums pret gaismu,
- plikpaurība,
- pastiprināta svīšana,
- nopietnas alerģiskas reakcijas (piemēram, zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)). DRESS sākotnēji izpaužas kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas un pēc tam ar plašākiem izsitumiem, augstu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātiem aknu enzīmu rādītājiem asins analīzēs un viena tipa balto asins šūnu daudzuma palielināšanos (eozinofīliju),
- patoloģisks muskuļu vājums, kas var izraisīt nieru darbības traucējumus,
- muskuļu sāpes,
- stīvums,
- patvaļīga urīna noplūde (nesaturēšana),
- apgrūtināta urinēšana,
- zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi jaundzimušajiem gadījumā, ja viņi ir bijuši pakļauti preparāta iedarbībai grūtniecības laikā,
- ilgstoša un/vai sāpīga erekcija,
- ķermeņa temperatūras regulācijas problēmas vai pārkaršana,
- sāpes krūškurvī,
- plaukstu, potīšu vai pēdu pietūkums,
- asins izmeklējumos: paaugstināta vai svārstīga cukura koncentrācija, paaugstināts glikolizētā hemoglobīna līmenis,
- nespēja pretoties impulsam, veikt darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu Jums vai kādam citam, tajā skaitā:
    - spēcīga tieksme uz azartspēlēm, neņemot vērā sekas, ko tās rada personīgajā vai ģimenes dzīvē,
    - izmainīta vai palielināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, paaugstināta dzimumtieksme,
    - nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās,
    - pārēšanās (liela ēdiena daudzuma uzņemšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk kā nepieciešams izsalkuma remdināšanai),
    - nosliece uz klaiņošanu.

    Pastāstiet ārstam, ja Jums parādās kāda no šīm uzvedībām; ārsts ar Jums apspriedīs veidus, kā kontrolēt vai mazināt šos simptomus.

Aripiprazola lietošanas laikā tika ziņots par vairākiem nāves gadījumiem vecāka gadagājuma pacientiem ar demenci. Turklāt ziņots par insultu vai mikroinsultu.

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem
13 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem novēroto blakusparādību biežums un tips bija līdzīgs kā pieaugušajiem, izņemot miegainību, nekontrolētu muskuļu raustīšanos vai patvaļīgas kustības, nemieru un noguruma sajūtu, ko novēroja ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 pacientiem), un bieži (vairāk nekā līdz 1 no 100 pacientiem) novēroja sāpes vēdera augšdaļā, sausu muti, paātrinātu sirdsdarbību, ķermeņa masas palielināšanos, palielinātu ēstgribu, muskuļu raustīšanos, nekontrolējamas roku un kāju kustības un reiboņa sajūtu, īpaši pieceļoties no guļus vai sēdus pozīcijas.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Arisppa

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Arisppa satur
- Aktīvā viela ir aripiprazols. Katra tablete satur 10 mg vai 15 mg aripiprazola.
- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze (E460), kukurūzas ciete, hidroksipropilceluloze (E463), sarkanais dzelzs oksīds (E172) – tikai 10 mg tabletēs, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) – tikai 15 mg tabletēs un magnija stearāts (E470b). Skatīt 2. punktu "Arisppa satur laktozi".

Arisppa ārējais izskats un iepakojums
10 mg tabletes: gaiši rozā, taisnstūrveida tabletes ar iespējamiem tumšākiem un gaišākiem plankumiem un vienā pusē iegravētu A10 (garums: 8 mm, platums: 4,5 mm, biezums: 2,1–3,1 mm).
15 mg tabletes: gaiši dzeltenas līdz brūngani dzeltenas, apaļas, nedaudz abpusēji izliektas tabletes ar nošķeltām malām un ar iespējamiem tumšākiem un gaišākiem plankumiem un vienā pusē iegravētu A15 (diametrs: 7,5 mm, biezums: 2,5–3,7 mm).

Arisppa ir pieejams blisteros pa 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 vai 100 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotājs
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums	Zāļu nosaukums
Ungārija, Igaunija, Grieķija, Horvātija, Lietuva, Latvija, Slovākija, Malta	Arisppa
Bulgārija	Ариспа

SASKAŅOTS ZVA 30-05-2023

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2023

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras (www.zva.gov.lv) tīmekļa vietnē.