

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Zykalor 10 mg tabletes

Zykalor 15 mg tabletes

Aripiprazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabāiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicāiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Zykalor un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Zykalor lietošanas
3. Kā lietot Zykalor
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Zykalor
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Zykalor un kādam nolūkam to lieto

Zykalor satur aktīvo vielu aripiprazolu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem.

To lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 15 gadu vecuma, kuriem ir slimība ar šādiem raksturīgiem simptomiem, piemēram, neesošu lietu dzirdēšana, redzēšana vai jušana; aizdomīgums, maldīgi uzskati, nesakarīga runa un uzvedība un emocionāls seklums. Cilvēki ar šādu stāvokli var izjust arī depresiju, vainas apziņu, trauksmi vai sasprindzinājumu.

Zykalor lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 13 gadu vecuma, kuriem ir slimība ar šādiem simptomiem, piemēram, pārmērīgi pacilāts garastāvoklis, pārmērīgs enerģiskums, miegam nepieciešams daudz mazāk laika nekā parasti, ātra runa un trauksmainas idejas un, dažkārt, izteikta aizkaitināmība. Pieaugušiem pacientiem, kuri veiksmīgi ārstējušies ar Zykalor, šīs zāles palīdz arī neatgriezties šajā stāvoklī.

2. Kas Jums jāzina pirms Zykalor lietošanas

Nelietojiet Zykalor šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aripiprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zykalor lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ārstēšanas ar aripiprazolu laikā ir ziņots par pašnāvnieciskām domām un rīcību. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas domas vai sajūtas, ka Jūs varētu nodarīt sev ļaunu.

Pirms Zykalor lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir:

- augsts cukura līmenis asinīs (ar tādiem simptomiem kā izteiktas slāpes, palielināts izvadītā urīna daudzums, pastiprināta ēstgriba un vājuma sajūta) vai cukura diabēts ģimenes anamnēzē;
- krampji (lēkmes), jo tādā gadījumā ārsts var vēlēties Jūs pastiprināti novērot;
- nekontrolējamās, neregulāras muskuļu kustības, it īpaši sejā;
- kardiovaskulāras slimības (sirds un asinsrites slimības), sirds un asinsvadu slimības ģimenes anamnēzē, insults vai mikroinsults, asinsspiediena izmaiņas;

- asins recekļi vai asins recekļi ģimenes anamnēzē, jo asins recekļu veidošanās ir saistīta ar antipsihotisko līdzekļu lietošanu;
- iepriekš bijusi pārmērīga tieksme uz azartspēlēm.

Ja Jums novērojama ķermeņa masas palielināšanās, neparastas kustības, miegainība, kas traucē veikt ikdienas darbus, vai jebkādas rīšanas grūtības, vai alerģiski simptomi, lūdzu, informējiet par to ārstu.

Ja Jūs esat gados vecāks pacients, kurš slimo ar demenci (atmiņas vai citu garīgu spēju zudumu), Jums vai Jūsu aprūpētājam/piederīgajiem jāpastāsta ārstam, ka Jums iepriekš ir bijis insults vai mikroinsults.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir domas vai sajūtas, ka Jūs varētu nodarīt sev pāri. Aripiprazola terapijas laikā ir ziņots par pašnāvnieciskām domām un uzvedību.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir muskuļu stīvums vai nekustīgums ar augstu ķermeņa temperatūru, svīšanu, garīgā stāvokļa izmaiņām vai ļoti ātra, vai neregulāra sirdsdarbība.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās tieksmes vai kāre uzvesties sev neierastā veidā un Jūs nevarat pretoties impulsam, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas var kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šāda uzvedība tiek saukta par impulsu kontroles traucējumiem, un tā var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, patoloģiski pastiprināta dzimumtieksme vai uzmācīgas seksuālas domas vai jūtas.

Ārstam var būt nepieciešams pielāgot Jūsu zāļu devu vai pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Aripiprazols var izraisīt miegainību, asinsspiediena pazemināšanos, pieceloties stāvus, reiboni un izmaiņas spējā kustēties un noturēt līdzsvaru, kā rezultātā ir iespējama krišana. Ir jāievēro piesardzība, it īpaši tad, ja esat gados vecāks pacients vai Jums ir novājināts organisms.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži, kuri jaunāki par 13 gadiem. Nav zināms, vai šo zāļu lietošana šiem pacientiem ir droša un efektīva.

Citas zāles un Zykalor

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Asinsspiedienu pazeminošas zāles: Zykalor var pastiprināt asinsspiedienu pazeminošo zāļu iedarbību. Noteikti informējiet ārstu, ja Jūs lietojat zāles asinsspiediena kontrolei.

Lietojot Zykalor kopā ar dažām citām zālēm, ārstam var būt nepieciešams mainīt aripiprazola vai arī citu zāļu devu. Ļoti svarīgi pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat:

- zāles sirds ritma korekcijai (piemēram, hinidīnu, amiodaronu, flekainīdu);
- antidepresantus vai ārstniecības augu līdzekļus depresijas un trauksmes ārstēšanai (piemēram, fluoksetīnu, paroksetīnu, venlafaksīnu, divšķautņu asinszāli);
- pretsēnīšu līdzekļus (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu);
- noteiktas zāles HIV infekcijas ārstēšanai (piemēram, efivarenu, nevirapīnu, kā arī proteāzes inhibitorus (piemēram, indinavīru, ritonavīru));
- pretkrampju zāles, ko lieto, lai ārstētu epilepsiju (piemēram, karbamazepīnu, fenitoīnu, fenobarbitālu);
- noteiktus antibiotiskos līdzekļus, kurus lieto tuberkulozes ārstēšanai (rifabutīnu, rifampicīnu).

Šīs zāles var palielināt blakusparādību risku vai pavājināt aripiprazola iedarbību. Ja, lietojot jebkuras šīs zāles vienlaicīgi ar Zykalor, Jums rodas jebkādi neparasti simptomi, Jums ir jāvērsas pie ārsta.

Depresijas, ģeneralizētas trauksmes, obsesīvi kompulsīvo traucējumu (OKT) un sociālās fobijas, kā arī migrēnas un sāpju ārstēšanai parasti tiek lietotas zāles, kuras paaugstina serotonīna līmeni:

- triptāni, tramadols un triptofāns, ko lieto depresijas, ģeneralizētas trauksmes, obsesīvi kompulsīvo traucējumu (OKT) un sociālās fobijas, kā arī migrēnas un sāpju ārstēšanai;

- selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (SSAI) (piemēram, paroksetīns un fluoksetīns), ko lieto depresijas, OKT, panikas un trauksmes ārstēšanai;
- citi antidepresanti (piemēram, venlafaksīns un triptofāns), ko lieto depresijas ārstēšanai;
- tricikliskie līdzekļi (piemēram, klomipramīns un amitriptilīns), ko lieto depresijas ārstēšanai;
- divšķautņu asinszāle (*Hypericum perforatum*) – ārstniecības augu līdzeklis, ko lieto vieglas depresijas formas ārstēšanai;
- pretsāpju līdzekļi (piemēram, tramadols un petidīns), ko lieto sāpju mazināšanai;
- triptāni (piemēram, sumatriptāns un zolmitriptāns), ko lieto migrēnas ārstēšanai.

Šīs zāles var palielināt blakusparādību risku. Ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm vienlaicīgi ar Zykalor un Jums rodas kādi neparasti simptomi, konsultējieties ar ārstu.

Zykalor kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Šīs zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Zykalor lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas Zykalor pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), iespējami šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas traucējumi, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam rodas kāds no šiem simptomiem, Jums var būt nepieciešams sazināties ar ārstu.

Ja Jūs lietojat Zykalor, ārsts, ņemot vērā ieguvumu Jums no ārstēšanas un ieguvumu bērnam no barošanas ar krūti, apspriedīs ar Jums, vai barot bērnu ar krūti. Nedrīkst vienlaicīgi ārstēties un barot ar krūti. Ja Jūs lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu par labāko veidu, kā barot savu bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu lietošanas laikā ir iespējams reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4. punktu).

Tas jāņem vērā gadījumos, kad ir nepieciešama pilnīga uzmanība, piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus.

Zykalor satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Zykalor

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir 15 mg vienu reizi dienā. Tomēr ārsts var nozīmēt mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ārstēšanos ar aripirazolu var uzsākt ar mazu devu, lietojot šķīdumu iekšķīgai lietošanai. Devu pakāpeniski var palielināt, līdz tiek sasniegta **ieteicamā deva pusaudžiem – 10 mg vienu reizi dienā.** Tomēr ārsts var nozīmēt mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Zykalor nav pieejams attiecīgajā zāļu formā (šķīdums iekšķīgai lietošanai). Jālieto alternatīvas zāles, kas satur šo pašu aktīvo vielu.

Ja Jums šķiet, ka Zykalor iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Centieties lietot tableti katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Nav svarīgi, vai lietojat šīs zāles kopā

ar ēdienu vai tukšā dūšā. Tablete vienmēr jānorij vesela, uzdzerot ūdeni.

Pat ja Jūs jūtaties labāk, nemainiet Zykalor devu un nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jūs esat lietojis Zykalor vairāk nekā noteikts

Ja Jums liekas, ka esat lietojis vairāk Zykalor nekā ārsts to ieteicis (vai arī kāds cits ir lietojis Jūsu Zykalor), nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Ja tas nav iespējams, dodieties uz tuvāko slimnīcu, ņemot līdzi zāļu iepakojumu.

Pacienti, kuri ir lietojuši pārāk daudz aripiprazola, ir novēroti šādi simptomi:

- paātrināta sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, runas problēmas;
- neparastas kustības (it īpaši sejas vai mēles kustības) un apziņas traucējumi.

Citi iespējamie simptomi ir:

- akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma, drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas kombinācija;
- muskuļu stīvums un vājums vai miegainība, palēnināta elpošana, smakšana, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi.

Ja Jums novērojams jebkas no iepriekš minētā, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Zykalor

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu, lietojiet izlaisto devu, tiklīdz Jūs to atceraties, bet nelietojiet divas devas vienas dienas laikā.

Ja pārtraucat lietot Zykalor

Nepārtrauciet ārstēšanos tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt lietot Zykalor tik ilgi, cik to ir noteicis ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10):

- cukura diabēts;
- miega traucējumi;
- trauksmes sajūta;
- nemiera sajūta un nespēja saglabāt mieru, grūtības mierīgi nosēdēt;
- akatīzija (nepatīkama iekšēja nemiera sajūta un nepārvarama nepieciešamība nepārtraukti pārvietoties);
- nekontrolējamās kustības, saraustītas vai sāpošas lokanas kustības;
- trīce;
- galvassāpes;
- nogurums;
- miegainība;
- apdulluma sajūta;
- drebuļi un neskaidra redze;
- retāka vai apgrūtināta vēdera izeja;
- gremošanas traucējumi;
- slikta dūša;
- lielāks siekalu daudzums mutē nekā parasti;
- vemšana;
- noguruma sajūta.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100):

- palielināta vai samazināta prolaktīna (hormons) koncentrācija asinīs;
- pārmērīgi palielināts cukura līmenis asinīs;
- depresija;
- seksuālās tieksmes izmaiņas vai pastiprināšanās;
- nekontrolējamas mutes, mēles vai locekļu kustības (tardīvā diskinēzija);
- kustību īpatnības izraisoši muskuļu darbības traucējumi (distonija);
- nemierīgo kāju sindroms;
- redzes dubultošanās;
- acs jutība pret gaismu;
- paātrināta sirdsdarbība;
- strauja asinsspiediena pazemināšanās pieceloties, kas izraisa reiboni, apdullumu vai samaņas zudumu;
- žagas.

Pēc aripiprazola iekšķīgi lietojamās formas izplatīšanas uzsākšanas ir ziņots par zemāk minētajām blakusparādībām, taču to sastopamības biežums nav zināms:

- samazināts balto asins šūnu skaits;
- samazināts trombocītu skaits;
- alerģiska reakcija (piemēram, mutes, mēles, sejas un rīkles pietūkums, nieze, nātrene);
- cukura diabēta rašanās vai saasināšanās, ketoacidoze (ketoni asinīs un urīnā) vai koma;
- palielināts cukura līmenis asinīs;
- samazināts nātrijs līmenis asinīs;
- ēstgribas zudums (anoreksija);
- ķermeņa masas samazināšanās;
- ķermeņa masas palielināšanās;
- domas par pašnāvību, pašnāvības mēģinājums un pašnāvība;
- agresivitāte;
- uzbudinājums;
- nervozitāte;
- simptomu kombinācija, kas ietver drudzi, muskuļu stīvumu, paātrinātu elpošanu, svīšanu, apziņas traucējumus un pēkšņas asinsspiediena un sirdsdarbības izmaiņas, ģīboni (ļaudabīgais neiroleptiskais sindroms);
- krampji;
- serotonīna sindroms (reakcija, kura var izraisīt pārmērīgas laimes sajūtu, miegainumu, tūlīgumu, nemieru, dzēruma sajūtu, drudzi, svīšanu vai muskuļu saspringumu);
- runas traucējumi;
- acu ābolu nofiksēšanās vienā stāvoklī;
- pēkšņa, neizskaidrojama nāve;
- dzīvībai bīstami neregulāra sirdsdarbība;
- sirdslēkme;
- palēnināta sirdsdarbība, asins recekļi vēnās, it īpaši kāju vēnās (iespējamie simptomi ir kāju pietūkums, sāpes un apsārtums), kuri pa asinsvadiem var nokļūt plaušās, izraisot sāpes krūškurvī un grūtības elpot (ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību);
- paaugstināts asinsspiediens;
- ģībonis;
- nejauša ēdiena ieelpošana ar pneimonijas (plaušu infekcijas) risku;
- muskuļu spazmas balsenes rajonā;
- aizkuņģa dziedzera iekaisums;
- rīšanas grūtības;
- caureja;
- diskomforta sajūta vēderā;
- diskomforta sajūta kuņģī;
- aknu mazspēja;
- aknu iekaisums;
- ādas un acu baltumu dzelte;

- ziņojumi par novirzēm aknu analīžu rādītājos;
 - izsitumi uz ādas;
 - ādas jutīgums pret gaismu;
 - plikpaurība;
 - pastiprināta svīšana;
 - nopietnas alerģiskas reakcijas, piemēram, zāļu izraisīta reakcija ar eozinofiliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS). DRESS sākotnēji izpaužas kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas un pēc tam ar plašākiem izsitumiem, augstu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātiem aknu enzīmu rādītājiem asins analīzēs un viena tipa balto asins šūnu daudzuma palielināšanos (eozinofiliju);
 - patoloģiska muskuļu noārdīšanās, kas var izraisīt nieru darbības traucējumus;
 - muskuļu sāpes;
 - stīvums;
 - nekontrolējama urīna noplūde (nesaturēšana);
 - apgrūtināta urinēšana;
 - zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi jaundzimušajiem gadījumā, ja viņi ir bijuši pakļauti zāļu iedarbībai grūtniecības laikā;
 - ilgstoša un/vai sāpīga erekcija;
 - ķermeņa temperatūras regulācijas problēmas vai pārkaršana;
 - sāpes krūškurvī;
 - plaukstu, potīšu vai pēdu pietūkums;
 - novirzes asins analīzēs: cukura līmeņa svārstības, paaugstināts glikolizētā hemoglobīna līmenis;
 - nespēja pretoties impulsam, veikt vai plānot darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu Jums vai kādam citam, tajā skaitā:
 - spēcīga tieksme uz pārmērīgu nodošanos azartspēlēm, neņemot vērā sekas, ko tās rada personīgajā vai ģimenes dzīvē;
 - izmainīta vai palielināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, paaugstināta dzimumtieksme;
 - nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās;
 - pārēšanās (liela ēdiena daudzuma uzņemšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk kā nepieciešams izsalkuma remdināšanai);
 - nosliece uz klaiņošanu.
- Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas šāda uzvedība. Ārsts ar Jums apspriedīs veidus, kā kontrolēt vai mazināt šos simptomus.

Aripiprazola lietošanas laikā tika ziņots par vairākiem nāves gadījumiem gados vecākiem pacientiem ar demenci. Turklāt ziņots par insultu vai mikroinsultu.

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Pusaudžiem no 13 gadu vecuma novēroto blakusparādību sastopamības biežums un veids bija līdzīgs kā pieaugušajiem, izņemot miegainību, nekontrolētu muskuļu raustīšanos vai saraustītas kustības, nemieru un noguruma sajūtu, ko novēroja ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10), un bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10) novēroja sāpes vēdera augšdaļā, sausu muti, paātrinātu sirdsdarbību, ķermeņa masas palielināšanos, palielinātu ēstgribu, muskuļu trīci, nekontrolējamu roku un kāju kustības un reiboņa sajūtu, it īpaši pieceloties no guļus vai sēdus pozīcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zykalor

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zykalor satur

- Aktīvā viela ir aripiprazols. Katra tablete satur 10 vai 15 mg aripiprazola.
- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, kukurūzas ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, magnija stearāts.
- 10 mg tabletes** satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172).
- 15 mg tabletes** satur arī dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Zykalor ārējais izskats un iepakojums

10 mg tabletes

Sārtas modificēta taisnstūra formas tabletes, kuru izmērs ir apmēram 8,5 x 4,0 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē. Tabletes var sadalīt vienādās devās.

15 mg tabletes

Gaiši dzeltenas, apaļas tabletes (diametrs apmēram 7,0 mm).

OPA/Al/PVH-AL blisteri kartona kastītēs pa 14, 28, 30, 56, 60, 84 un 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kipra

Ražotājs

MEDOCHEMIE LTD, Factory AZ: 2 Michael Erakleous street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, Limassol, Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts	Zāļu nosaukums
Igaunija	Zykalor
Kipra	Zykalor 10 mg Δισκία Zykalor 15 mg Δισκία
Bulgārija	Zykalor 10 mg таблетки Zykalor 15 mg таблетки
Lietuva	Zykalor 15 mg tabletės Zykalor 10 mg tabletės
Čehija	Zykalor 10 mg Tablety Zykalor 15 mg Tablety
Slovākija	Zykalor 10 mg Tablety Zykalor 15 mg Tablety
Malta	Zykalor 10 mg Tablets Zykalor 15 mg Tablets
Latvija	Zykalor 10 mg tabletes Zykalor 15 mg tabletes
Rumānija	Zykalor 10 mg Comprimate Zykalor 15 mg Comprimate
Horvātija	Zykalor 10 mg Tablete

	Zykalor 15 mg Tablete
Griekija	Zykalor 10 mg Δισκία Zykalor 15 mg Δισκία
Portugāle	Zykalor 10 mg comprimidos Zykalor 15 mg comprimidos
Spānija	Zykalor 10 mg comprimidos Zykalor 15 mg comprimidos
Slovēnija	Zykalor 10 mg tablete Zykalor 15 mg tablete

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2022.gada augustā.