

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Aspirin 500 mg tabletes

acidum acetylsalicylicum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiēt šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiēt farmaceutam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējiēties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 3-5 dienām nejiētaties labāk vai jiētaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Aspirin 500 mg un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Aspirin 500 mg lietošanas
3. Kā lietot Aspirin 500 mg
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Aspirin 500 mg
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Aspirin 500 mg un kādam nolūkam to lieto

Aspirin 500 mg ir indicēts simptomātiskai, galvas sāpju, zobu sāpju, saaukstēšanās izraisīta kakla iekaisuma, muguras sāpju, menstruālo sāpju, muskuļu un locītavu sāpju, vieglu artrīta sāpju remdēšanai.

Aspirin 500 mg lieto arī simptomātiskai sāpju un drudža remdēšanai saaukstēšanās un gripas gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Aspirin 500 mg lietošanas

Nelietojiet Aspirin 500 mg šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret acetilsalicilskābi vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums ir bijusi astma, ko izraisījusi salicilātu vai tiem līdzīgas iedarbības zāļu lietošana, it īpaši nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana,
- ja Jums ir akūta kuņģa-zarnu trakta čūla,
- ja Jums ir asinsreces traucējumi, hemorāģiskā diatēze (slimība, kas izpaužas kā atkārtota asinsizplūdumu veidošanās ādā, zemādā, deguna un smaganu asiņošana, ilgstoša asiņošana no virspusējām brūcēm) vai hemofilija (iedzimta asins slimība, kuras rezultātā asins recēšana ir traucēta),
- ja Jums ir smaga nieru, aknu vai sirds mazspēja,
- ja Jūs lietojat metotreksāta devas, kas lielākas par 15 mg nedēļā (metotreksāts ir zāles, kuras lieto vēža, reimatoīdā artrīta un citu autoimūno slimību ārstēšanā),
- ja Jums ir grūtniecības pēdējais trimestris,
- drudža un vīrusa infekcijas gadījumā Aspirin 500 mg nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 16 gadiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Aspirin 500 mg, nepieciešama šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret citām pretsāpju, pretiekaisuma vai pretreimatisma zālēm vai cita veida alerģijām,
- ja Jums ir bijušas kuņģa un zarnu čūlas, tai skaitā hroniski vai periodiski čūlas slimības paasinājumi,
- ja Jums anamnēzē ir kuņģa un zarnu asiņošana,
- ja Jūs vienlaicīgi lietojat zāles, kas kavē asins recēšanu (antikoagulantus),
- ja Jums ir nieru darbības traucējumi,
- ja Jums ir sirds asinsrites traucējumi,
- ja Jums ir aknu darbības traucējumi,
- ja Jums ir podagra,
- ja Jums ir bronhiālā astma, siena drudzis, deguna polipi vai hroniskas elpceļu slimības,
- ja Jums ir plānota ķirurģiska operācija (tai skaitā nelielas operācijas, piemēram, zobu ekstrakcija), konsultējieties ar ārstu par Aspirin 500 mg lietošanu, jo tā aktīvā viela acetilsalicilskābe samazina asins recēšanu, tāpēc var paaugstināties asiņošanas risks,
- ja Jums ir noteikta enzīma (glikozes-6-fosfātdehidrogenāzes) deficīts.

Pirms Aspirin 500 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem acetilsalicilskābe ir kontrindicēta vīrusu infekcijas gadījumā, ar drudzi vai bez tā, bez konsultēšanās ar ārstu. Dažu vīrusu infekciju gadījumos, it īpaši A tipa gripas, B tipa gripas un vējbaku gadījumā, pastāv Reja sindroma risks - ļoti reta, bet potenciāli dzīvībai bīstama slimība, kad nepieciešama nekavējoša medicīniska palīdzība. Risks var būt paaugstināts, ja līdztekus lieto acetilsalicilskābi, tomēr nav pierādīta cēloņsakarība. Ja šo infekciju laikā parādās vemšana, tā var būt Reja sindroma pazīme.

Citas zāles un Aspirin 500 mg

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā:

- metotreksātu,
- zāles, kas ietekmē asins recēšanu (piemēram, kumarīna atvasinājumus, heparīnu vai tiklodipīnu),
- citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (zāles, ko lieto, lai ārstētu iekaisumu un sāpes),
- zāles, kas veicina urīnskābes izvadīšanu no organisma (piemēram, benzobromaronu, probenecīdu),
- digoksīnu (zāles, ko lieto sirds slimību ārstēšanai),
- zāles cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, sulfonilurīnvielu),
- diurētiskos līdzekļus (zāles, ko lieto dažādu slimību, piemēram, paaugstināta asinsspiediena, glaukomas un tūskas ārstēšanai),
- iekšķīgi lietojamus vai injicējamus kortikosteroīdus (hormonus, ko lieto iekaisuma un alerģijas ārstēšanai), izņemot hidrokortizonu, ko lieto Adisona slimības ārstēšanai,
- dažas zāles, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai (enalaprilu, fosinoprilu un citas tā sauktās angiotenzīnkonvertējošo enzīmu inhibitorus),
- valproiskābi (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai),
- selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitorus (zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai).

Aspirin 500 mg var ietekmēt citu zāļu darbību, un citas zāles var ietekmēt Aspirin 500 mg darbību. Tāpēc pacienti nedrīkst lietot Aspirin 500 mg kopā ar jebkuru no iepriekšminētajām vielām, ja vien ārsts to īpaši nav norādījis.

Aspirin 500 mg kopā ar uzturu

Ārstēšanās laikā ar Aspirin 500 mg jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Informējiet ārstu, ja grūtniecība iestājas laikā, kad ilgstoši lietots Aspirin 500 mg.

Grūtniecība – pēdējais trimestris

Nelietojiet Aspirin 500 pēdējos 3 grūtniecības mēnešos, jo tas var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam vai izraisīt komplikācijas dzemdībās. Tas var izraisīt nieru un sirds problēmas Jūsu nedzimušam bērnam. Tas var ietekmēt Jūsu un Jūsu bērna tieksmi asiņot un izraisīt dzemdības vēlāk vai ilgāk, nekā paredzēts.

Grūtniecība – pirmais un otrais trimestris

Nelietojiet Aspirin 500 pirmajos 6 grūtniecības mēnešos, ja vien tas nav absolūti nepieciešams un ārsta ieteikts. Ja Jums ir nepieciešama ārstēšana šajā periodā vai laikā, kad iestājas grūtniecība, jālieto vismazākā deva iespējami īsāku laiku. Ja zāles lietotas ilgāk par dažām dienām, sākot no 20. grūtniecības nedēļas, Aspirin 500 var izraisīt nieru darbības traucējumus Jūsu vēl nedzimušam bērnam, kas var izraisīt zemu amnija šķidruma līmeni, kas ieskauj mazuli (oligohidroamniji) vai asinsvadu (*ductus arteriosus*) sašaurināšanos mazuļa sirdī. Ja nepieciešama ārstēšana ilgāk par dažām dienām, Jūsu ārsts var ieteikt veikt papildu uzraudzību.

Aspirīns un tā metabolīti nelielā daudzumā nokļūst mātes pienā. Līdz šim nav saņemti ziņojumi par kaitīgu iedarbību zīdaiņiem, tāpēc parasti nav nepieciešams pārtraukt barošanu ar krūti, lietojot Aspirin 500 mg īslaicīgi ieteiktās devās sāpju vai drudža gadījumā. Tomēr Jums vajadzētu pārtraukt krūts barošanu, ja nozīmēta ilgstoša un/vai lielu devu Aspirin 500 mg lietošana.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aspirin 500 mg neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

3. Kā lietot Aspirin 500 mg

Vienmēr lietojiet Aspirin 500 mg tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiat ārstam vai farmaceitam.

Ja vien ārsts nav norādījis citādi, Jūs drīkstat lietot Aspirin 500 mg, kā norādīts turpmāk.

Ieteicamā deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ir 1 – 2 tabletes. Šo devu var atkārtot ik pēc katrām 4 stundām. Nelietojiet vairāk kā 8 tabletes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam Aspirin 500 mg nedrīkst lietot drudža un vīrusu infekcijas gadījumā.

Aspirin 500 mg ieteicams lietot pēc ēšanas. Norijiet tableti, uzdzerot lielu daudzumu ūdens.

Nelietojiet Aspirin 500 mg ilgāk par 3-5 dienām bez konsultācijas ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Aspirin 500 mg vairāk nekā noteikts

Nepārsniedziet norādīto devu. Pirmās pārdozēšanas pazīmes ir slikta dūša, vemšana, reibonis, troksnis ausīs, dzirdes pasliktināšanās, svīšana, galvassāpes, apjukums. Simptomi, kas liecina par smagu saindēšanos, ir samaņas zudums, drebuļi (nekontrolējama trīce), elpas trūkums un drudzis.

Ja Jūs esat lietojis lielu Aspirin 500 mg devu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Aspirin 500 mg

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var rasties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

- gremošanas traucējumi, sāpes vēdera augšējā vai apakšējā daļā,

Reti (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

- kuņģa-zarnu trakta iekaisums, čūla.

Ļoti reti (var rasties mazāk nekā 1 no 10000 cilvēkiem):

- kuņģa-zarnu trakta asiņošana, smadzeņu asiņošana,
- pārejoši aknu darbības traucējumi,
- nopietnas reakcijas, tai skaitā anafilaktiskais šoks.

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- diafragmai līdzīgs zarnu sašaurinājums,
- paaugstināts asiņošanas risks (deguna, smaganu, urīnceļu, dzimumorgānu asiņošana operācijas laikā vai pēc tās). Asiņošana var izraisīt dzelzs deficīta anēmiju (piemēram, sakarā ar slēptu mikroasiņošanu), kurai raksturīga, piemēram, astēnija, bālums, hipoperfūzija,
- paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, acetilsalicilskābes izraisīta elpošanas sistēmas slimība, vieglas un vidēji smagas reakcijas, kas var skart ādu; elpošanas sistēmas, kuņģa-zarnu trakta un sirds un asinsvadu sistēmas reakcijas, tai skaitā izsitumi, nātrene, tūska, nieze, iesnas, aizlikts deguns, sirds un elpošanas sistēmas traucējumi,
- nieru darbības traucējumi, akūts nieru bojājums,
- hemolīze un hemolītiskā anēmija pacientiem ar smagu glikozes-6-fosfātdehidrogenāzes (G6FD) deficītu.
- reibonis, nespēks un troksnis ausīs, kas varētu norādīt uz Aspirin 500 mg pārdozēšanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Aspirin 500 mg

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicāiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aspirin 500 mg satur

- Aktīvā viela ir acetilsalicilskābe. Katra tablete satur 500 mg acetilsalicilskābes.
- Citas sastāvdaļas ir celuloze, pulveris un kukurūzas ciete.

Aspirin 500 mg ārējais izskats un iepakojums

Aspirin 500 mg ir apaļas baltas tabletes blistera iepakojumā. Blisteri ražoti no bezkrāsainas caurspīdīgas polipropilēna plēves un zaļas vai standarta alumīnija krāsas folijas.

Viens kartona iepakojums satur 20 vai 100 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Lietuva

Ražotājs

Bayer Bitterfeld GmbH
Greppin, Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Vācija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA Bayer
Skanstes 50, Rīga, LV-1013
Tālrunis: +371 67845563
E-pasts: mi.baltic@bayer.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2023