

Iopamiro 300, 612,4 mg / ml, šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml šķīduma injekcijām satur 612,4 mg jopamidola.

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sāļsskābe.

50 ml šķīduma injekcijām

Katrā 50 ml pudelē ir 30,62 g jopamidola, kas atbilst 15 g joda, koncentrācijā 300 mg joda / ml.

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 165997

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN024-01

Iopamiro 300, 612,4 mg / ml, šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml šķīduma injekcijām satur 612,4 mg jopamidola.

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sāļsskābe.

100 ml šķīdums injekcijām

Katrā 100 ml pudelē ir 61,24 g jopamidola, kas atbilst 30 g joda, koncentrācijā 300 mg joda / ml.

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 165997

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN024-02

Iopamiro 300, 612,4 mg / ml, šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml šķīduma injekcijām satur 612,4 mg jopamidola.

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sāļsskābe.

200 ml šķīdums injekcijām

Katrā 200 ml pudelē ir 122,48 g jopamidola, kas atbilst 60 g joda, koncentrācijā 300 mg joda / ml.

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 165997

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN024-03

Iopamiro 300, 612,4 mg / ml, šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml šķīduma injekcijām satur 612,4 mg jopamidola.

Palīgvielas: kalcijs dinātrija dihidrāts, trometamols, sāļsskābe.

500 ml šķīdums injekcijām

Katrā 500 ml pudelē ir 306,20 g jopamidola, kas atbilst 150 g joda, koncentrācijā 300 mg joda / ml.

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 165997

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN024-04

Saskaņots Zāļu valsts aģentūrā 23.11.2020.