

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola.

Katrā 50 ml pudelē ir 37,76 g jopamidola, kas atbilst 18,5 g joda, koncentrācijā 370 mg joda / ml.

Palīgvielas: kalcija dinātrijs dihidrāts, trometamols, sālskābe.

50 ml šķīdums injekcijām

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 166097

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma

Zāļu identifikācijas numurs RN025-01

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola.

Katrā 100 ml pudelē ir 75,53 g jopamidola, kas atbilst 37 g joda, koncentrācijā 370 mg joda / ml.

Palīgvielas: kalcija dinātrijs dihidrāts, trometamols, sālskābe.

100 ml šķīdums injekcijām

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 166097

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN025-02

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentgena kontrastviela.

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola.

Katrā 200 ml pudelē ir 151,06 g jopamidola, kas atbilst 74 g joda, koncentrācijā 370 mg joda / ml.

Palīgvielas: kalcija dinātrijs dihidrāts, trometamols, sālskābe.

200 ml šķīdums injekcijām

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 166097

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Zāļu identifikācijas numurs RN025-03

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām

Iopamidolum

Rentģena kontrastviela.

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola.

Katrā 500 ml pudelē ir 377,65 g jopamidola, kas atbilst 185 g joda, koncentrācijā 370 mg joda / ml.

Palīgvielas: kalcijs dinātrijs dihidrāts, trometamols, sāļsskābe.

500 ml šķīdums injekcijām

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 20134, Milāna, Itālija

Reģistrācijas apliecības Nr. : 166097

Recepšu zāles.

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma

Zāļu identifikācijas numurs RN025-04

Saskaņots Zāļu valsts aģentūrā 23.11.2020.