ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Influcid tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete (250 mg) satur:
Aktīvās vielas:

Aconitum D3	25 mg
Gelsemium D3	25 mg
Ipecacuanha D3	25 mg
Phosphorus D5	25 mg
Bryonia D2	25 mg
Eupatorium perfoliatum D1	25 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts (240 mg tabletē), kviešu ciete (9 mg tabletē).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes.
Baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas, plakanas tabletes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie
Akūtas saslimšanas gadījumā jālieto 1 tablete katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam: *akūtas saslimšanas gadījumā* jālieto 1 tablete ik pēc 2 stundām (ne vairāk kā 8 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Pusaudžiem no 12 gadiem: *akūtas saslimšanas gadījumā* jālieto 1 tablete katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gada vecumam (skat. 4.4. punktu)

Lietošanas veids

Tabletes jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē.
Maziem bērniem tabletes ieteicams izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai pret jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārskatīšana ir nepieciešama:
- ja pacienta stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 7 dienām,
- ja rodas papildu sūdzības,
- ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C.

Influcid satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Influcid satur kviešu cieti. Kviešu ciete var saturēt glutēnu, bet nelielos daudzumos, tādēļ tā tiek uzskatīta par drošu pacientiem ar celiakiju. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīga no celiakijas).

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā stāvokļa pasliktināšanās). Šādos gadījumos pacientiem ir ieteicams pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

Pediatriskā populācija
Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gada vecumam, jo nav pietiekošu datu par iedarbību un drošumu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu lietošanu.

Pacientiem ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, ja viņi lieto, nesen ir lietojuši vai varētu lietot kādas citas zāles.

Piezīme: homeopātisko līdzekļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi, kā arī stimulatoru lietošana, vai alkohols un tabaka.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tāpat kā visas zāles, Influcid var lietot tikai pozitīva ieguvuma un riska attiecības gadījumā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti ((<1/10 000) vai biežums nav zināms (tas nevar tikt noteikts vadoties pēc pieejamiem datiem): paaugstinātas jutības reakcijas, piem., ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos jāpārtrauc Influcid lietošana un jānozīmē atbilstoša terapija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV

1003.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskās zāles. ATĶ kods: V03AX.

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības izpratni un ārstniecisko vielu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē, pakāpeniski atšķaidot. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, stiprinot organisma pašdziedināšanās spējas, tās neiedarbojas uz kādu konkrētu orgānu. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša. Organisma reakcija uz homeopātisko līdzekli ir ļoti individuāla.

Šo iemeslu dēļ nevar noteikt devai specifisku farmakoloģisko efektu, to farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav piemērojami, jo Influcid kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm preklīniskie pētījumi nav veikti.

6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

20 tabletes PVH un alumīnija folijas blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju. Iepakojumā 40 vai 60 tabletes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi par iznīcināšanu.

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Alpen Pharma GmbH
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija
tel +49 7243 200 49 20
e-pasts info.germany@alpenpharma.com

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

00-0990

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 18.10.2000.
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 14.03.2007.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2023