

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

GASTROCYNESINE tabletes

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto **GASTROCYNESINE tabletes** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **GASTROCYNESINE tabletes** un kādam nolūkam tās lieto
2. Pirms **GASTROCYNESINE tablešu** lietošanas
3. Kā lietot **GASTROCYNESINE tabletes**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **GASTROCYNESINE tabletes**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR GASTROCYNESINE tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

GASTROCYNESINE tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto tādu gremošanas traucējumu kā smaguma sajūta un sāpes kuņģī, gāzu uzkrāšanās, grēmas, miegainība pēc maltītes, simptomātiskai ārstēšanai.

2. PIRMS GASTROCYNESINE tablešu LIETOŠANAS

Nelietojiet GASTROCYNESINE tabletes šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām un/vai kādu citu **GASTROCYNESINE tablešu** sastāvdaļu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Līdz šim mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Negatīva ietekme, lietojot GASTROCYNESINE tabletes grūtniecības un zīdīšanas laikā, nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

Svarīga informācija par kādu no GASTROCYNESINE tablešu sastāvdaļām

Palīgvielas ar kādu zināmu efektu: saharoze un laktoze.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT GASTROCYNESINE TABLETES

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem

Pa 1 vai 2 tabletēm 15 minūtes pirms ēšanas. Ja nepieciešams, atkārtot pēc ēšanas.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti izšķīdiniet šķidrumā.

Lietojot bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, pirms zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu.

Zāļu lietošanas ilgumam nevajadzētu pārsniegt 10 dienas.

Ja esat lietojis GASTROCYNESINE tabletes vairāk nekā noteikts

Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot GASTROCYNESINE tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, **GASTROCYNESINE tabletes** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT GASTROCYNESINE TABLETES

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot **GASTROCYNESINE tabletes** pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko GASTROCYNESINE tabletes satur

Vienā tabletē (300mg):

- Aktīvās vielas ir:
 - Abies nigra 4 CH 75 mg
 - Carbo vegetabilis 4 CH 75 mg
 - Nux vomica 4 CH 75 mg
 - Robinia pseudo acacia 4 CH 75 mg

- Citas sastāvdaļas ir: saharoze, laktoze un magnija stearāts.

GASTROCYNESINE tablešu ārējais izskats un iepakojums

Baltas, cilindriskas tabletes.
Kartona kastītē 60 tabletes.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN RAŽOTĀJS

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija
SIA "G. Miežis Ārsts"
Mūkusalas iela 51,
Rīga, LV 1004
Tel/fakss: +371 67532498

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 11/2013