

**Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam  
Hepar compositum N šķīdums injekcijām**

Šķīdums injekcijām intramuskulārai (i.m), subkutānai (s.c) vai intravenozai (i.v.) lietošanai.

Homeopātiskas zāles

**Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Hepar compositum N šķīdums injekcijām un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Hepar compositum N šķīdums injekcijām lietošanas
3. Kā lietot Hepar compositum N šķīdums injekcijām
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Hepar compositum N šķīdums injekcijām
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

**1. Kas ir Hepar compositum N šķīdums injekcijām un kādam nolūkam to lieto**

Hepar compositum N šķīdums injekcijām ir homeopātiskas zāles aknu detoksikācijas funkciju stimulēšanai akūtu un hronisku aknu/žultsceļu slimību, piemēram, holangīta un holecistīta gadījumā; toksiskas izcelsmes funkcionālu aknu darbības traucējumu gadījumā, kas ir citu slimību cēlonis vai rezultāts; hiperholesterinēmijas, sarkanās vilkēdes, toksiskas eksantēmas, dermatozes un dermatīta, neirodermīta gadījumā, kā arī aknu šūnu funkciju stimulēšanai.

**2. Kas Jums jāzina pirms Hepar compositum N šķīduma injekcijām lietošanas**

**Nelietojiet Hepar compositum N šķīdumu injekcijām šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

**Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Pirms Hepar compositum N šķīduma injekcijām lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, Jums jākonsultējas ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu. Pēc hinīnu saturošu zāļu lietošanas var rasties paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, alerģiskas ādas reakcijas vai drudzis.

**Bērni**

Hepar compositum N šķīduma injekcijām drošums un efektivitāte bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, nav noteikta. Dati nav pieejami.

**Citas zāles un Hepar compositum N šķīdums injekcijām**

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

**Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte**

Nav zināms, ka šajās zālēs esošo vielu homeopātiskie atšķaidījumi būtu toksiski grūtniecības un ar krūti barošanas laikā.

Nav pieejami klīniskie dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības un ar krūti barošanas laikā. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, tāpat kā ar citām zālēm, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Hepar compositum N šķīdums injekcijām neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

### **Hepar compositum N šķīdums injekcijām satur etanolu**

Šīs zāles satur 1,8 mg etilspirta (alkohola) katrā ampulā (0,08 % w/w).

Nelielais alkohola daudzums vienā šo zāļu ampulā ir līdzvērtīgi mazāk nekā 1 ml alus vai 1 ml vīna.

Nelielais alkohola daudzums zālēs neizraisa ievērojamu ietekmi.

### **Hepar compositum N šķīduma injekcijām satur nātriju**

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā ampulā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

## **3. Kā lietot Hepar compositum N šķīdumu injekcijām**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Akūtā vai sākotnējā deva

Pieaugušie un bērni no 12 gadu vecuma: injicē 1 ampulas saturu katru dienu, un pēc tam turpina ar standarta devu.



Standarta deva

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti injicē 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā.

### Lietošanas veids

Hepar compositum N lieto intramuskulāri, subkutāni vai intravenozi.

Norādījumi stikla ampulas atvēršanai:



Rīkoties uzmanīgi. Ievērojiet atvēršanas instrukciju. Stikla ampulas atgriešana nav nepieciešama. Turiet ampulas galviņu uz augšu leņķī un piesitiet/kratiet ampulas galviņā esošo šķīdumu. Pēc tam nolauziet ampulas galviņu, spiežot to prom no krāsas punkta. Atlikušais ampulas saturs jāiznīcina.

### **Ja esat lietojis Hepar compositum N šķīdumu injekcijām vairāk nekā noteikts**

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

### **Ja esat aizmirsis lietot Hepar compositum N šķīdumu injekcijām**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto individuālo devu.

### **Ja Jūs pārtraucat lietot Hepar compositum N šķīdumu injekcijām**

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

## **4. Iespējamās blakusparādības**

Tāpat kā visas zāles, šīs homeopātiskās zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti reti (<1:10 000) var rasties paaugstinātas jutības reakcijas.

### **Ziņošana par blakusparādībām**

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv).

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

## **5. Kā uzglabāt Hepar compositum N šķīdums injekcijām**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:” un etiķetes uz ampulas pēc “Der.līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

### **Ko Hepar compositum N šķīdums injekcijām satur:**

- Katra 2,2 ml (2,2 g) ampula satur aktīvās vielas:

|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| Hepar suis                    | D 8  | 22 mg |
| Cyanocobalaminum              | D 4  | 22 mg |
| Duodenum suis                 | D 10 | 22 mg |
| Thymus suis                   | D 10 | 22 mg |
| Colon suis                    | D 10 | 22 mg |
| Vesica fellea suis            | D 10 | 22 mg |
| Pankreas suis                 | D 10 | 22 mg |
| Cinchona pubescens            | D 4  | 22 mg |
| Lycopodium clavatum           | D 4  | 22 mg |
| Chelidonium majus             | D 4  | 22 mg |
| Silybum marianum              | D 3  | 22 mg |
| Histaminum                    | D 10 | 22 mg |
| Sulfur                        | D 13 | 22 mg |
| Avena sativa                  | D 6  | 22 mg |
| Natrium diethyloxalaceticum   | D 10 | 22 mg |
| Acidum alpha-ketoglutaricum   | D 10 | 22 mg |
| Acidum malicum                | D 10 | 22 mg |
| Acidum fumaricum              | D 10 | 22 mg |
| Calcium carbonicum Hahnemanni | D 28 | 22 mg |
| Taraxacum officinale          | D 4  | 22 mg |
| Cynara scolymus               | D 6  | 22 mg |
| Veratrum album                | D 4  | 22 mg |
| Acidum DL-alpha-liponicum     | D 8  | 22 mg |
| Acidum oroticum monohydricum  | D 6  | 22 mg |

- Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

**Hepar compositum N šķīduma injekcijām ārējais izskats un iepakojums:**

Dzidrs un bezkrāsains līdz viegli sārts šķīdums.

Iepakojumā ir 10 vai 100 stikla (I klase) ampulas pa 2,2 ml katrā ampulā. Ampulas iepakotas kartona kastītē.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

e-pasts: [info@heel.com](mailto:info@heel.com)

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2023**