

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Coenzyme compositum šķīdums injekcijām

Šķīdums injekcijām intradermālai, intramuskulārai (i.m.) vai subkutānai (s.c.) lietošanai.
Homeopātiskas zāles.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Coenzyme compositum un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Coenzyme compositum lietošanas
3. Kā lietot Coenzyme compositum
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Coenzyme compositum
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Coenzyme compositum un kādam nolūkam to lieto

Coenzyme compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto bloķētas enzīmu sistēmas pastiprināšanai deģeneratīvu slimību vai fermentu darbības traucējumu gadījumā (celulārā fāze).

2. Kas Jums jāzina pirms Coenzyme compositum lietošanas

Nelietojiet Coenzyme compositum šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Bērni

Nav piemērots bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Coenzyme compositum

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Coenzyme compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Coenzyme compositum satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles dienas devā satur mazāk par 1mmol (23mg) nātrija. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Coenzyme compositum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma ir: parasti injicē 1 ampulu 1-3 reizes nedēļā.

Coenzyme compositum var injicēt zemādā, ādā vai muskulī.
Injekciju veic persona, kas ir apmācīta injekciju veikšanā.

Ja esat lietojis Coenzyme compositum vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Coenzyme compositum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Coenzyme compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var būt alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piem., alerģiskas reakcijas uz ādas, apsārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Coenzyme compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu uzlīmes pēc Derīgs līdz:. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Coenzyme compositum satur

- Viena ampula 2.2 ml (=2.2 g) satur aktīvās vielas:
Coenzymum A D8 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Acidum cis-aconicum D8 22 mg, Acidum citricum D8 22 mg, Acidum fumaricum D8 22 mg, Acidum alpha-ketoglutaricum D8 22 mg, Acidum malicum D8 22 mg, Acidum succinicum D8 22 mg, Barium oxalsuccinicum D10 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 mg, Natrium pyruvicum D8 22 mg, Cysteinum D6 22 mg, Pulsatilla pratensis D6 22 mg, Hepar sulfuris D10 22 mg, Sulfur D10 22 mg, Adenosinum triphosphoricum D10 22 mg, Nadidum D8 22 mg, Manganum phosphoricum D6 22 mg, Magnesium oroticum dihydricum D6 22 mg, Cerium oxalicum D8 22 mg, Acidum DL-alpha-liponicum D6 22 mg, Beta vulgaris rubra D4 22 mg
- Citas sastāvdaļas: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Coenzyme compositum ārējais izskats un iepakojums

Coenzyme compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Iepakojumā pa 10 un 100 ampulām pa 2,2 ml ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden

Vācija
Tālrunis: 0049 7221 501-00
Fakss: 0049 7221 501 485
E-pasts: info@heel.de

Izplatītājs

SIA Farmahelis
Partizanu g. 198-5
50324 Kaunas
Lietuva
Tālrunis, fakss: 0037037-452559
E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 10/2013.