

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam
Ibuprofen Lannacher 600 mg apvalkotās tabletes
Ibuprofenum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Ibuprofen Lannacher 600 mg un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas
3. Kā lietot Ibuprofen Lannacher 600 mg
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Ibuprofen Lannacher 600 mg
6. Iepakojuma saturs un cita informācija.

1. Kas ir Ibuprofen Lannacher 600 mg un kādam nolūkam to lieto

Ibuprofen Lannacher 600 mg apvalkotās tabletes satur aktīvo vielu ibuprofēnu, kas pieder tā saucamajai nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) grupai. **Ibuprofēns mazina sāpes, pazemina temperatūru un samazina iekaisumu.**

Jūs varat izmantot Ibuprofen Lannacher 600 mg lai:

- īslaicīgi mazinātu sāpes un iekaisumu,
- mazinātu drudzi, tostarp temperatūras paaugstināšanos pēc vakcinācijas.

Ibuprofen Lannacher 600 mg ir efektīvs:

- galvassāpju mazināšanai,
- muskuļu un locītavu sāpju gadījumā,
- menstruāciju un zobu sāpju gadījumā,
- mīksto audu bojājuma, muskuļu sasprindzinājuma un locītavu izmežģījuma gadījumā,
- migrēnas ārstēšanai un profilaksei,
- lai ārstētu sāpīgu pēcoperācijas un posttraumatisku iekaisumu.

2. Kas Jums jāzina pirms Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas

Lietojot ibuprofēnu, ir ziņots par alerģiskas reakcijas pazīmēm pret šīm zālēm, tostarp elpošanas traucējumiem, sejas un kakla zonas pietūkumu (angioedēma), sāpēm krūtīs. Nekavējoties pārtrauciet Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanu un sazinieties ar ārstu, vai meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no šīm pazīmēm.

Nelietojiet Ibuprofen Lannacher 600 mg šādos gadījumos:

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret ibuprofēnu vai kādu no palīgvielām,
- ja Jums ir bijušas paaugstinātas jutības reakcijas agrāk (astma, rinīts, angioedēma, nātrene), lietojot citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NSPL), ieskaitot acetilsalicilskābes atvasinājumus,
- ja Jums ir smaga aknu mazspēja,
- ja Jums ir smaga nieru mazspēja,
- ja Jums ir smaga sirds mazspēja,
- ja Jums norit grūtniecības pēdējie trīs mēneši,

- ja Jums ir vai ir bijušas divas vai vairākas peptiskas čūlas vai asiņošanas epizodes,
- ja Jums ir bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana, vai perforācija, kas saistīta ar iepriekšēju NSPL lietošanu,
- ja Jums ir galvas smadzeņu asiņošana (smadzeņu asinsvadu plīsums), kuņģa vai zarnu asiņošana, vai cita veida asiņošana,
- ja Jums ir asins šūnu veidošanās traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāļu nevēlamās blakusparādības var samazināt, lietojot mazāko efektīvāko devu, kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāko laiku.

Tādu pretiekaisuma/pretsāpju zāļu kā ibuprofēns lietošana var tikt saistīta ar nelielu paaugstinātu sirdstriekas vai triekas (insulta) risku, it īpaši lietojot lielās devās. Nepārsniedziet ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu.

Saistībā ar ibuprofēna lietošanu ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, tostarp eksfoliatīvu dermatītu, daudzformu eritēmu, Stīvensa-Džonsona sindromu, toksisku epidermas nekrolīzi, zāļu izraisītu reakciju ar eozinofiliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS), akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AGEP). Nekavējoties pārtrauciet Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no 4. punktā aprakstītajiem simptomiem, kas saistīti ar šīm nopietnajām ādas reakcijām.

Pirms Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas pārrunājiet ārstēšanu ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums:

- ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram, sirds mazspēja, stenokardija (sāpes krūšu kurvī), vai ir bijusi sirdstrieka, šunta operācija, perifēro artēriju slimība (slikta asins cirkulācija kājās vai pēdās šauru vai bloķētu artēriju dēļ) vai jebkāda veida trieka (insults) (tostarp “mini trieka” jeb pārejošas išēmiskas lēkmes (TIA)).
- ir paaugstināts asinsspiediens, diabēts, augsts holesterīna līmenis, ģimenes anamnēzē ir bijušas sirds slimības vai insults vai smēķējat.

Ja Jums ir bijusi kuņģa vai zarnu čūla, īpaši, ja tā ir noritējusi ar perforāciju vai asiņošanu, Jums vajadzētu pievērst uzmanību jebkurām neparastām sāpēm vēderā, it īpaši, uzsākot ārstēšanu, un nekavējoties informēt savu ārstu. Šādā gadījumā gastrointestinālās (kuņģa un zarnu) asiņošanas un perforācijas risks ir augstāks, it īpaši gados vecākiem pacientiem. Kuņģa un zarnu asiņošana, čūlas vai perforācija var attīstīties bez jebkādam brīdinājuma pazīmēm, pat ja Jums nav bijušas šādas slimības. Šie simptomi var būt nāvējoši. Pārtrauciet šo zāļu lietošanu gastrointestinālās (kuņģa un zarnu) asiņošanas vai perforācijas gadījumā.

Ādas reakcijas

Saistībā ar Ibuprofen Lannacher 600 mg terapiju ziņots par smagām ādas reakcijām. Ja Jums rodas jebkādi izsitumi uz ādas, gļotādu bojājumi, pūslīši vai citas alerģijas pazīmes, Jums nekavējoties jāpārtrauc Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošana un jāmeklē medicīniska palīdzība, jo šīs var būt ļoti smagas ādas reakcijas pirmās pazīmes. Skatīt 4. punktu.

Īpaša piesardzība ir nepieciešama šādos gadījumos, tāpēc, lūdzu, izstāstiet par tiem savam ārstam:

- ja Jums ir hiperlipidēmija (paaugstināts lipīdu un/vai lipoproteīnu līmenis),
- ja Jums ir vai ir bijis paaugstināts asinsspiediens vai Jūsu sirds nav darbojusies pareizi iepriekšējās NPL lietošanas laikā,
- ja Jums ir sistēmiskā sarkanā vilkēde vai citi saistaudu bojājumi,
- ja Jums ir nieru un/vai aknu darbības traucējumi,
- ja Jums ir astma, alerģija, hroniskas iesnas, hronisks sinusīts, un/vai deguna polipi,
- ja Jūs lietojat citas zāles (skatīt apakšpunktu "Citas zāles un Ibuprofen Lannacher 600 mg"),
- ja Jums ir infekcija – lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Infekcijas

Ibuprofen Lannacher 600 mg var slēpt infekciju pazīmes, piemēram, drudzi un sāpes. Tāpēc iespējams, ka Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas dēļ var tikt kavēta infekcijas atbilstošas ārstēšanas uzsākšana, un

tas var paaugstināt komplikāciju risku. Tas novērots baktēriju izraisītas pneimonijas (plaušu karsoņa) un ar vējbakām saistītu bakteriālu ādas infekciju gadījumā. Ja Jūs lietojat šīs zāles, kamēr Jums ir infekcija, un infekcijas simptomi nepāriet vai pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Gados vecākiem pacientiem ir paaugstināts nevēlamu blakusparādību attīstības risks.

Jūsu ārsts ieteiks Jums veikt regulāras asins analīzes, ja Jūs lietojat Ibuprofen Lannacher 600 mg ilgstošai ārstēšanai.

Var attīstīties gastrointestinālā (kuņģa un zarnu) trakta darbības traucējumi un hroniskas zarnu iekaisīgas slimības (čūlainais kolīts, Krona slimība).

Pamatojoties uz atsevišķiem datiem, kas pierāda, ka zāles, kas inhibē ciklooksigenāzes/prostaglandīna sintēzi, ietekmē ovulāciju, iespējams auglības nomākums sievietēm. Auglība atjaunojas pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem līdz 15 gadu vecumam Ibuprofen Lannacher 600 mg tabletes nav piemērotas, jo nav pieejami pietiekami dati par to drošumu un efektivitāti.

Dehidratētiem bērniem un pusaudžiem pastāv nieru bojājumu risks.

Citas zāles un Ibuprofen Lannacher 600 mg

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ibuprofen Lannacher 600 mg var ietekmēt citas zāles vai to var ietekmēt citu zāļu iedarbība, piemēram:

- antikoagulanti (t.i., asins šķīdināšanai/trombu veidošanās novēršanai paredzētas zāles, piem., aspirīns/acetilsalicilskābe, varfarīns, tiklopidīns),
- zāles, kas pazemina augstu asinsspiedienu (AKE inhibitori, piemēram, kaptoprils), bēta blokatori (piemēram, atenololu saturošas zāles) vai angiotensīna II receptoru antagonisti (piemēram, losartāns),
- zāles, ko lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai (steroīdie un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi),
- zāles, ko lieto, lai ārstētu paaugstinātu glikozes līmeni asinīs,
- diurētiskie līdzekļi (zāles, ko lieto, lai izvadītu ūdeni no organisma),
- zāles podagras ārstēšanai,
- digoksīns (zāles, ko lieto dažādu sirds slimību ārstēšanai),
- fenitoīns (zāles epilepsijas ārstēšanai),
- litījs (zāles, ko lieto garastāvokļa svārstību ārstēšanai),
- metotreksāts,
- mifepristons (zāles, ko izmanto, lai izraisītu abortu pirmajos divos grūtniecības mēnešos),
- noteikti antibiotiskie līdzekļi (hinolons, aminoglikozīdi),
- zidovudīns (zāles, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai),
- *Ginkgo biloba* augu ekstrakti, jo tie var ietekmēt vai tos var ietekmēt ibuprofēns,
- zālēm, ko lieto, lai nomāktu imūnsistēmu (ciklosporīns, takrolīms).

Arī citas zāles var ietekmēt Ibuprofen Lannacher 600 mg, vai arī tas var ietekmēt šīs citas zāles. Tādēļ pirms Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas kopā ar citām zālēm vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ibuprofen Lannacher 600 mg kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Šīs tabletes jālieto kopā ar pietiekamu daudzumu šķidruma maltītes laikā vai pēc tās.

Alkohols var samazināt kuņģa (vēdera) izturību pret zālēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Informējiet ārstu, ja Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanas laikā Jums iestājusies grūtniecība. Nelietot šīs zāles, ja Jums ir pēdējie 3 grūtniecības mēneši (skatīt 2. punktu "Nelietojiet Ibuprofen Lannacher 600 mg šādos gadījumos"), jo tas var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam vai izraisīt problēmas dzemdību laikā. Tas var izraisīt nieru un sirds problēmas Jūsu vēl nedzimušajam bērnam. Tas var ietekmēt Jūsu un Jūsu vēl nedzimušā bērna noslieci asiņot un var padarīt dzemdības vēlākas un ilgākas, nekā paredzams.

Nelietojiet Ibuprofen Lannacher 600 mg pirmajos 6 grūtniecības mēnešos, ja vien tas nav absolūti nepieciešams un to nav ieteicis ārsts. Ja Jums šajā laikā ir vajadzīga ārstēšana vai mēģināt panākt grūtniecības iestāšanos, jālieto vismazākā deva un visīsāko iespējamo laiku. Sākot no 20. grūtniecības nedēļas, Ibuprofen Lannacher 600 mg var izraisīt nieru darbības traucējumus. Jūsu vēl nedzimušajam bērnam, jo to lieto ilgāk par dažām dienām, kas var izraisīt mazu ap bērnu esošā augļūdens daudzumu (oligohidramijs) vai sašaurināt asinsvadus (*ductus arteriosus*) nedzimušā bērna sirdī. Ja ārstēšana nepieciešama ilgāk nekā dažas dienas, ārsts var ieteikt papildu uzraudzību.

Barošana ar krūti

Šīs zāles mātes pienā izdalās tikai ļoti nelielā daudzumā. Tomēr, ja vien tas nav nepieciešams, Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošana barošanas ar krūti periodā nav ieteicama.

Fertilitāte

Grūtniecības iestāšanās ārstēšanas laikā ar Ibuprofen Lannacher 600 mg var būt apgrūtināta. Ja plānojat grūtniecību vai cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos, informējiet savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ibuprofēns var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpoiet mehānismus, ja Jūs ievērojat: redzes traucējumus, reiboni, nogurumu vai citus centrālās nervu sistēmas traucējumus. **Jums jāapzinās šo zāļu lietošanas sekas, pirms mēģināt vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.**

Ibuprofen Lannacher 600 mg satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Ibuprofen Lannacher 600 mg, konsultējieties ar ārstu.

Ibuprofen Lannacher 600 mg satur krāsvielu saulrieta dzeltenu (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Ibuprofen Lannacher 600 mg

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir pa ½ līdz 1 tabletei kā reizes deva.

Nepārsniedziet maksimālo dienas devu, kas ir 2400 mg ibuprofēna (4 tabletes).

Jālieto mazākā iedarbīgā deva iespējami īsāku laiku, kas nepieciešama, lai atvieglotu simptomus. Ja Jums ir infekcija, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja tās simptomi (piemēram, drudzis un sāpes) nepāriet vai pasliktinās (skatīt 2. punktu).

Nelietojiet šīs zāles vairāk nekā nepieciešams simptomu kontrolei. Zāļu nevēlamās blakusparādības var samazināt, lietojot mazāko efektīvo devu, kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāku laiku.

Gados vecākiem pacientiem, kā arī pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lieto iekšķīgi ēšanas laikā vai pēc tās, uzdzerot pietiekami daudz šķidruma.
Tableti var sadalīt vienādās devās.

Ja esat aizmirsis lietot Ibuprofen Lannacher 600 mg

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja esat lietojis Ibuprofen Lannacher 600 mg vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Ibuprofen Lannacher 600 mg vairāk nekā noteikts vai ja bērns ir netīšām norijis zāles, vienmēr sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai izvērtētu iespējamo risku un saņemtu konsultāciju par turpmāko rīcību.

Iespējamie simptomi var būt slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana (var būt ar asins piejaukumu), galvas sāpes, dzīkstēšana ausīs, dezorientācija un spontānas acu ābolu kustības. Lielās devās var izraisīt miegainību, sāpes krūšu kurvī, sirdsklauves, samaņas zudumu, krampjus (galvenokārt bērniem), vājumu un reiboni, asinis urīnā, aukstuma sajūtu un elpošanas traucējumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet lietot Ibuprofen Lannacher 600 mg un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no šādiem simptomiem:

- sarkanīgi, līdzēni, mērķim līdzīgi vai aplveida plankumi uz ķermeņa, bieži ar pūslīšiem centrā ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, uz dzimumorgāniem un acīs. Pirms šādu nopietnu ādas izsitumu parādīšanās, var būt drudzis un gripai līdzīgi simptomi [eksfoliatīvs dermatīts, daudzformu eritēma, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze];
- plaši izsitumi, augsta ķermeņa temperatūra un palielināti limfmezgli (DRESS sindroms);
- sarkani, zvīņaini un plaši izsitumi ar izciļņiem zem ādas un pūslīšiem, un vienlaikus drudzis. Šādi simptomi parasti rodas ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantēmatoza pustuloze).

Visbiežāk novērotās blakusparādības ir kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Var attīstīties peptiskas čūlas vai asiņošana, dažreiz ar letālu iznākumu, sevišķi gados vecākiem pacientiem. Turklāt var attīstīties arī slikta dūša, vemšana, caureja, vēdera uzpūšanās, aizcietējums, dispepsija, sāpes vēderā, melēna, asiņainu masu atvemšana, čūlainais stomatīts, čūlainā kolīta un Krona slimības paasinājums, retāk gastrīts.

Kuņģa-zarnu trakta asiņošanas attīstība ir sevišķi atkarīga no devas un lietošanas ilguma.

Par **smagām paaugstinātas jutības reakcijām** ziņojumi saņemti ļoti reti (var skart līdz 1 no 10000 cilvēkiem) ar šādiem simptomiem: sejas, mēles un balsenes tūska, aizdusa, tahikardija, hipotensija (piemēram, anafilakse, angioedēma vai smags šoks), astmas un bronhu spazmu paasinājums. **Pārtrauciet lietot Ibuprofen Lannacher 600 mg un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai neatliekamās palīdzības nodaļu tuvākajā slimnīcā.**

Tādu zāļu kā Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošana var būt saistīta ar neredzami palielinātu **sirdslēkmes** (miokarda infarkta) vai **insulta** attīstības risku.

Nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar ibuprofēna lietošanu īslaicīgai ārstēšanai un ieteicamās devas ir norādītas turpmāk. Lietojot Ibuprofen Lannacher 600 mg ilgstošai hronisku slimību ārstēšanai, iespējama arī citu nevēlamu blakusparādību attīstība.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- galvassāpes,

- sāpes vēderā, dispepsija (gremošanas traucējumi), slikta dūša,
- dažādu veidu ādas izsitumi,
- paaugstinātas jutības reakcijas, kas izpaužas kā nātrene (tūska, ādas apvidu apsārtums) un nieze (kasīšanās).

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

- caureja, sāpes vēderā (palielināta vēdera spiediena un tilpuma sajūta), aizcietējums un vemšana.

Ļoti retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

- sirdslēkme (miokarda infarkts),
- hipertensija (augsts asinsspiediens),
- asinsrades traucējumi (anēmija, hemolītiskā anēmija, aplastiskā anēmija, leikopēnija, trombocitopēnija, pancitopēnija, agranulocitoze), kuru sākotnējie simptomi ir drudzis, kasīšanās kaklā, čūlains stomatīts, gripai līdzīgi simptomi, smags izsīkums, deguna un ādas asiņošana,
- peptiska čūla, kuņģa un zarnu perforācija vai asiņošana, tumša un kavēta vēdera izeja ar asiņu piejaukumu, asiņainu masu atvemšana, kas reizēm mēdz būt letāla, sevišķi gados vecākiem pacientiem, un čūlainā kolīta un Krona slimības norises pasliktināšanās,
- astma, bronhu spazmas, apgrūtināta un/vai smaga elpošana,
- samazināts urīna daudzums un tūska (šķidruma uzkrāšanās zem ādas), akūta nieru mazspēja, nieru papillāra nekroze (sevišķi ilgstošas lietošanas laikā) un paaugstināts urīnvielas līmenis serumā,
- smagas ādas reakcijas, piemēram, daudzformu eritēma un toksiskā epidermas nekrolīze, ekfoliatīvs dermatīts, Stīvensa-Džonsona sindroms,
- atsevišķi aseptiska meningīta gadījumi (ar sprandas stīvuma simptomiem, galvassāpēm, sliktu dūšu, vemšanu, drudzi vai dezorientāciju), par ko saņemti ziņojumi ibuprofēna lietošanas laikā pacientiem ar autoimūnām slimībām (piem., sistēmisko sarkano vilkēdi, jaukto saistaudu slimību),
- nomākta aknu darbība, aknu darbības traucējumi, sevišķi ilgstošas ārstēšanas vai lietošanas laikā, hepatīts un dzelte,
- psihotiskas reakcijas, depresija,
- redzes traucējumi,
- tinnīts (zvanīšana ausīs) un reibonis,
- šķidruma uzkrāšanās zem ādas, un, jo īpaši, apakšējo ekstremitāšu tūska sakarā ar šķidruma uzkrāšanos,
- ezofagīts, pankreatīts, zarnu striktūras,
- smagas ādas Varicella infekcijas,
- nieru bojājums un urīnskābes līmeņa paaugstināšanās asinīs.

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

- var rasties smaga ādas reakcija, kas pazīstama kā DRESS sindroms. DRESS sindroma simptomi ietver izsitumus uz ādas, drudzi, limfmezglu pietūkumu un eozinofilu (balto asins šūnu paveids) skaita palielināšanos,
- sarkani, zvīņaini un plaši izsitumi ar izciļņiem zem ādas un pūslīšiem, galvenokārt lokalizēti ādas krokās, uz rumpja un augšējām ekstremitātēm, ko pavada drudzis ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze). Ja Jums rodas šie simptomi, pārtrauciet Ibuprofen Lannacher 600 mg lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Skatīt arī 2. punktu.
- sāpes krūtīs, kas var liecināt par potenciāli nopietnu alerģisku reakciju, ko sauc par Kounis sindromu.
- āda kļūst jutīga pret gaismu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ibuprofen Lannacher 600 mg

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ibuprofen Lannacher 600 mg satur

Aktīvā viela ir ibuprofēns.

Viena apvalkotā tablete satur 600 mg ibuprofēna .

Citas sastāvdaļas ir kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, nātrija cietes glikolāts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, polivinilspirts, makrogols 3350, talks, titāna dioksīds, karmīns (E120), saulrieta dzeltenais E110.

Ibuprofen Lannacher 600 mg ārējais izskats un iepakojums

Ibuprofen Lannacher 600 mg ir pieejams blisteriepakojumā ar 30, 50, vai 100 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma veidi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

G.L. Pharma, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austrija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01/2024