

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

STOMAGELS 5 mg/20 mg/g gels

methyluracilum, lidocaini hydrochloridum monohydricum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **Stomagels** un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms **Stomagela** lietošanas
3. Kā lietot **Stomagelu**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Stomagelu**
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Stomagels un kādam nolūkam to lieto

Stomagels ir līdzeklis oromukozālai lietošanai – lietošanai uz mutes gļotādas. To lieto mutes dobuma gļotādas nekrotisko, iekaisīgo procesu: akūta mutes dobuma gļotādas iekaisuma (stomatīts), smaganu iekaisuma (gingivīts), parodontozes (zobu un parodonta slimība), mikrobu un sēnīšu izraisīta mutes gļotādas sausuma un dedzināšanas gadījumos.

2. Kas Jums jāzina pirms Stomagela lietošanas

Nelietojiet Stomagelu šādos gadījumos

- akūtas leikozes un hronisku leukēmisko formu gadījumos, limfogranulomatozes, kaula smadzeņu ļaundabīgu slimību gadījumos;
- smagu aknu slimību gadījumos;
- pacientiem ar paaugstinātu jutību pret amīdu tipa lokālās anestēzijas līdzekļiem vai kādu citu gela sastāvdaļu;
- bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- Nepieļaut gela iekļūšanu acīs, jo tam ir viegli kairinoša iedarbība uz acs gļotādu.
- Pacientiem ar zināmu alerģiju pret citiem amīdu tipa vietējas anestēzijas līdzekļiem iespējama

krustota alerģija pret lidokaīna hidrohlorīdu.

- Piesardzība lietošanā jāievēro pacientiem ar sirds-asinsvadu sistēmas traucējumiem.

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Svarīga informācija par kādu no Stomagela sastāvdaļām

Šīs zāles satur 300 mg alkohola (etilspirta) katrā 15 g tūbiņā, kas ir līdzvērtīgi 20 mg/g. Tas var izraisīt dedzinošu sajūtu uz bojātas ādas.

Gela sastāvā iekļautā palīgviela metilparahidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

Stomagela lietošana kopā ar uzturu

Nav ieteicams ēst 2 stundu laikā pēc Stomagela lietošanas, lai nodrošinātu labāku aktīvo vielu iedarbību.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Gels potencē strofantīna iedarbību, pastiprina antibiotiku un sulfānilamīda preparātu darbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Stomagelam nav lietošanas ierobežojumu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Stomagels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Stomagelu

Vienmēr lietojiet **Stomagelu** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Stomagels paredzēts oromukozālai lietošanai – lietošanai uz mutes gļotādas. Slimības skartās vietas mutes dobumā pārklāt ar plānu gela kārtu 3 – 4 reizes dienā. Gela lietošanas ilgums līdz 10 dienām. Ja Jums liekas, ka **Stomagela** iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Stomagelu vairāk nekā noteikts

Liekais gela daudzums jānoņem ar vates tamponu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, **Stomagels** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamās vietējas alerģiskas reakcijas, vieglas galvassāpes un reibonis, garšas sajūtas pārmaiņas vai mēles nejutīgums.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Zīņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Stomagelu

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas pēc “Der.līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Sargāt no mitruma. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Stomagels satur

- Aktīvās vielas ir metiluracils, lidokaīna hidrochlorīda monohidrāts. Katrs grams gela satur 5 mg metiluracila un 20 mg lidokaīna hidrochlorīda monohidrāta.
- Citas sastāvdaļas ir skuju ēteriskās eļļas smagā frakcija, lecīfīns, silbiols, alfa tokoferols, metilparahidroksibenzoāts (E218), undecilēnskābes monoetanolamīds, trolamīns, karbomērs, etilspirts (96%), attīrīts ūdens.

Stomagela ārējais izskats un iepakojums

Stomagels ir dzeltenīgs, viendabīgs gels ar vieglu skuju smaržu. 15 gramu gela alumīnija tūbiņās ar plastmasas vāciņu. Tūbiņas kopā ar lietošanas instrukciju iepakotas kartona kastītēs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SIA “LMP”,

Vietalvas iela 1, Rīga,

LV-1009, Latvija

info@lmp.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2023