

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Duspatalin 200 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas mebeverini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabāiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicāiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Duspatalin un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Duspatalin lietošanas
3. Kā lietot Duspatalin
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Duspatalin
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Duspatalin un kādam nolūkam to lieto

Zāļu pilns nosaukums ir Duspatalin 200 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas. Šajā instrukcijā tiek lietots saīsinātais nosaukums – Duspatalin. Duspatalin satur aktīvo vielu, ko sauc par mebeverīna hidrohlorīdu. Duspatalin pieder zāļu grupai, ko sauc par spazmolītiķiem, kas darbojas uz Jūsu zarnām. Zarnas ir garš, muskuļots cauruļveida orgāns, pa kuru pārvietojas barība tā, lai tā tiktu sagremota. Ja zarnā ir spazmas un tā sakļaujas pārāk cieši, Jums var būt sāpes. Šīs zāles darbojas tā, lai mazinātu spazmas un atvieglotu sāpes.

Duspatalin lieto, lai atvieglotu kairinātas zarnas sindroma simptomus. Šie simptomi var būt dažādi:

- sāpes vēderā un krampji;
- uzpūšanās sajūta un pastiprināta gāzu veidošanās vēderā (meteorisms);
- caureja, aizcietējums vai abu kombinācija;
- nelieli, cieti, granulveida vai lentveida izkārnījumi (fēces).

Duspatalin tiek lietots arī, lai atvieglotu krampjus un sāpes vēderā vai zarnās, ko izraisa citas slimības.

2. Kas Jums jāzina pirms Duspatalin lietošanas

Nelietojiet Duspatalin šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret mebeverīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet Duspatalin, ja iepriekš minētais attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms šo zāļu lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Duspatalin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Duspatalin

Nav paredzams, ka Duspatalin ietekmēs jebkādas citas zāles, kuras lietojat. Taču pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, kuras var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Duspatalin nav ieteicams lietošanai grūtniecības laikā. Jūsu ārsts var ieteikt Jums pārtraukt Duspatalin lietošanu vai tā vietā lietot citas zāles.

Barošana ar krūti

Duspatalin nav ieteicams mātēm, kuras baro bērnu ar krūti. Jūsu ārsts var likt Jums pārtraukt barošanu ar krūti vai, ja Jūs vēlaties turpināt barot ar krūti, ieteikt lietot citas zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz iespējams, ka šīs zāles iespaidos Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus vai citus līdzekļus.

3. Kā lietot Duspatalin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Šo zāļu lietošana

- Norijiet kapsulas veselas, uzdzerot pilnu glāzi ūdens; tās nesasmalcināt un nekošļāt.
- Lietojiet kapsulas vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Tas palīdzēs Jums atcerēties nākamo devu.

Cik daudz zāļu lietot

Pieaugušie:

- Parastā deva ir viena 200 mg kapsula divas reizes dienā;
- Viena kapsula no rīta, otra - vakarā.

Ja esat lietojis Duspatalin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Duspatalin vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvāko slimnīcu. Paņemiet līdzi šo zāļu iepakojumu un lietošanas instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Duspatalin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Duspatalin

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiēt ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Duspatalin lietošanu un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību, ja novērojat kādu no šādām nopietnām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama steidzama palīdzība:

- elpošanas grūtības, sejas, kakla, lūpu, mēles vai rīkles pietūkšana. Jums var būt smaga alerģiska reakcija pret zālēm.

Citas blakusparādības ir:

- Jums var būt neliela alerģiska reakcija pret zālēm, t.i., izsitumi uz ādas, sarkana niezoša āda.

Ja novērojat jebko no minētā, pārtrauciet Duspatalin lietošanu un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Duspatalin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelieto. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Duspatalin satur

- Aktīvā viela ir mebeverīna hidrohlorīds (*mebeverini hydrochloridum*). Katra kapsula satur 200 mg mebeverīna hidrohlorīda.
- Citas sastāvdaļas ir:
 - kapsulas saturs: magnija stearāts, poliakrilāta dispersija 30%, talks, hipromeloze, metakrilskābes un etilakrilāta kopolimērs (1:1) dispersija 30%, glicerīna triacetāts;
 - kapsulas apvalks: želatīns, titāna dioksīds (E171), drukas tinte (šellaka (E904)), propilēna glikols, koncentrēts amonjaka šķīdums, kālija hidroksīds, melnais dzelzs oksīds (E172).

Duspatalin ārējais izskats un iepakojums

Duspatalin 200 mg ilgstošās darbības cietā kapsula ir necaurspīdīga balta 1. izmēra cietā želatīna kapsula ar standarta uzdruku “245”. Duspatalin ir iepakots pa 15 kapsulām PVH/Al vai PVH/PVDH/alumīnija blisteros. Kastītē ir 30 kapsulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Viatis SIA, Mūkusalas 101, Rīga, LV 1004, Latvija

Ražotājs

Mylan Laboratories S.A.S., Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2023. gada septembrī.