

**Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam****Nurofen Express 200 mg apvalkotās tabletes**  
*ibuprofenum*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.** Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabāiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Nurofen Express un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Nurofen Express lietošanas
3. Kā lietot Nurofen Express
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Nurofen Express
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

**1. Kas ir Nurofen Express un kādam nolūkam tās lieto**

Nurofen Express satur ibuprofēnu, kas pieder nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) grupai. NPL atvieglo stāvokli, mainot organisma atbildes reakciju pret sāpēm, pietūkumu un augstu temperatūru.

Nurofen Express lieto, lai remdētu:

- galvassāpes, muguras sāpes, sāpīgas menstruācijas, zobu sāpes, neiralģiju (nervu sāpes) un migrēnu;
- muskuļu sāpes, reimatisks sāpes un mērenas artrīta sāpes;
- saaukstēšanās un gripas simptomus, paaugstinātu temperatūru (drudzi).

**2. Kas Jums jāzina pirms Nurofen Express lietošanas**

Ir ziņots par alerģiskas reakcijas pazīmēm pret šīm zālēm, tostarp elpošanas traucējumiem, sejas un kakla rajona pietūkumu (angioedēma), sāpēm krūtīs, lietojot ibuprofēnu. Nekavējoties pārtrauciet Nurofen Express lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja pamanāt kādas no šīm pazīmēm.

**Nelietojiet Nurofen Express šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret ibuprofēnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir alerģija pret aspirīnu vai citiem pretsāpju līdzekļiem;
- ja Jums ir bijušas paaugstinātas jutības reakcijas (astma, iesnas, angioedēma vai nātrene) saistībā ar acetilsaliciskābes (aspirīna) vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) lietošanu;
- ja Jūs lietojat citus NPL, tai skaitā ciklooksigenāzes-2 inhibitorus vai aspirīnu vairāk nekā 75 mg dienā;
- ja Jūs esat pēdējos grūtniecības 3 mēnešos;
- ja Jums ir vai kādreiz ir bijusi kuņģa-zarnu trakta asiņošana vai perforācija, kas saistīta ar NPL terapiju. Aktīva peptiska čūla/asiņošana vai minētie traucējumi ir bijuši agrāk (divas vai vairākas pierādītas čūlas vai asiņošanas epizodes);
- ja Jums ir smaga aknu, nieru vai sirds mazspēja;

- ja Jums ir mazāk nekā 12 gadi;
- ja Jums ir asiņošana smadzenēs vai cita veida asiņošana;
- ja Jums ir asinsrades un asinsreces traucējumi.

### **Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Pirms Nurofen Express lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

- Jums ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram, sirds mazspēja, stenokardija (sāpes krūšu kurvī), vai ir bijusi sirdstrieka, šunta operācija, perifēro artēriju slimība (slikta asins cirkulācija kājās vai pēdās šauru vai bloķētu artēriju dēļ) vai jebkāda veida trieka (insults) (tostarp “mini trieka” jeb pārejošas išēmiskas lēkmes (TIA));
- Jums ir paaugstināts asinsspiediens, diabēts, augsts holesterīna līmenis, ģimenē ir bijušas sirds slimības vai insults vai Jūs smēķējat;
- Jums ir vai agrāk ir bijusi bronhiālā astma;
- Jums ir sistēmiskā sarkanā vilkēde – imūnās sistēmas slimība, kas izraisa locītavu sāpes, ādas pārmaiņas un citu orgānu darbības traucējumus vai jaukta tipa saistaudu slimība;
- Jums ir teikts par nātrija ierobežošanu uzturā;
- Jums ir pirmie 6 grūtniecības mēneši vai krūts barošanas periods;
- Nurofen Express pieder to zāļu grupai, kas var samazināt sieviešu auglību. Pārtraucot terapiju, efekts ir atgriezenisks. Maz ticams, ka, īslaicīgi lietojot, šīs zāles ietekmēs iespēju palikt stāvoklī. Tomēr pirms šo zāļu lietošanas, pastāstiet savam ārstam, ka Jums ir grūtniecība palikt stāvoklī;
- Jums ir nieru un aknu darbības traucējumi;
- Jums ir infekcija – lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Tādu pretiekaisuma/pretsāpju zāļu kā ibuprofēns lietošana var tikt saistīta ar nelielu paaugstinātu sirdstriekas vai triekas (insulta) risku, it īpaši lietojot lielās devās. Nepārsniedziet ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu.

### *Ādas reakcijas*

Saistībā ar ibuprofēna lietošanu ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, tostarp eksfoliatīvu dermatītu, daudzformu eritēmu, Stīvensa-Džonsona sindromu, toksisku epidermas nekrolīzi, zāļu izraisītu reakciju ar eozinofiliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS), akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AGEP). Nekavējoties pārtrauciet Nurofen Express lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no 4. punktā aprakstītajiem simptomiem, kas saistīti ar šīm nopietnajām ādas reakcijām.

### *Infekcijas*

Nurofen Express var slēpt infekciju pazīmes, piemēram, drudzi un sāpes. Tāpēc iespējams, ka Nurofen Express lietošanas dēļ var tikt kavēta infekcijas atbilstošas ārstēšanas uzsākšana, un tas var paaugstināt komplikāciju risku. Tas novērots baktēriju izraisītas pneimonijas (plaušu karsoņa) un ar vējbakām saistītu bakteriālu ādas infekciju gadījumā. Ja Jūs lietojat šīs zāles, kamēr Jums ir infekcija, un infekcijas simptomi nepāriet vai pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

### *Kuņģa-zarnu trakta (KZT) asiņošana, čūla un perforācija*

Ziņojumi par KZT asiņošanu, čūlu vai perforāciju ir saņemti saistībā ar visiem NPL. Ziņojumi liecina, ka minētās nevēlamās blakusparādības var rasties neatkarīgi no NPL lietošanas ilguma. Par nevēlamu blakusparādību rašanos var vēstīt brīdinājuma simptomi, bet tādi var arī nebūt, kā arī nevēlamās blakusparādības var rasties pacientiem, kam agrāk KZT traucējumi nav bijuši.

KZT asiņošanas, čūlas vai perforācijas risks ir lielāks, lietojot lielāku NPL devu. Lielāks minēto nevēlamo blakusparādību risks ir arī tiem pacientiem, kam agrāk bijusi čūla, īpaši ar komplikācijām (paasinājumiem): asiņošanu vai perforāciju, kā arī gados vecākiem pacientiem. Šiem pacientiem terapija jāsāk ar iespējami mazāku NPL devu. Šajos, kā arī gadījumos, kad tiek lietots aspirīns mazās devās vai citas zāles ar palielinātu KZT nevēlamu blakusparādību risku, rūpīgi jāapsver nepieciešamība NPL kombinēt ar līdzekļiem, kas pasargā kuņģa gļotādu no sālskābes darbības (gastroprotektoriem), piemēram, mizoprostolu vai protonu sūkņa inhibitoriem.

Pacientiem (īpaši gados vecākiem pacientiem), kam agrāk bija diagnosticēti KZT traucējumi, jāiesaka ziņot par ikvienu neparastu kuņģa-zarnu trakta simptomu (īpaši KZT asiņošanu). Būtiski minētiem simptomiem pievērst pastiprinātu uzmanību ārstēšanas sākumā.

Ja pacienti vienlaikus saņem līdzekļus, kuri var palielināt čūlas vai asiņošanas risku, piemēram, perorālos kortikosteroīdus, antikoagulantus (piemēram, varfarīnu), selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (antidepresanti) vai antitrombotiskos līdzekļus (piemēram, aspirīnu), ir jāievēro piesardzība. Ja pacientam, kurš lieto Nurofen Express, tiek diagnosticēta KZT asiņošana vai čūla, zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Pacientiem, kuriem agrāk bija diagnosticēta KZT slimība (čūlainais kolīts, Krona slimība), NPL jālieto piesardzīgi, jo iespējams slimības paasinājums.

#### *Gados vecāki pacienti*

Gados vecākiem pacientiem NPL lietošana biežāk izraisa nevēlamas blakusparādības, īpaši kuņģa-zarnu trakta asiņošanu un perforāciju, kas var izraisīt letālu iznākumu.

Zāļu nevēlamo blakusiedarbību var mazināt, lietojot mazāko efektīvo devu, kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāku laiku.

Dehidratētiem bērniem un pusaudžiem pastāv nieru bojājuma risks.

#### **Citas zāles un Nurofen Express**

Nelietojiet Nurofen Express, ja Jūs lietojat kādu citu NPL (ieskaitot COX-2 inhibitorus, piemēram, celekoksibs, etorikoksibs), citus pretsāpju līdzekļus vai aspirīnu (sāpju mazināšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nurofen Express var ietekmēt citu zāļu iedarbību, vai arī tās var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Piemēram:

- antikoagulanti (t.i., asins šķīdināšanai/trombu veidošanās novēršanai paredzētas zāles, piem., aspirīns/acetilsalicilskābe, varfarīns, tiklopidīns);
- zāles, kas pazemina augstu asinsspiedienu (AKE inhibitori, piemēram, kaptoprils), bēta-blokatori (piemēram, atenololu saturošas zāles) vai angiotensīna II receptoru antagonisti (piemēram, losartāns);
- urīndzenošie (diurētiskie) līdzekļi;
- kortikosteroīdi (piemēram, prednizolons vai deksametazons);
- metotreksāts (pretvēža līdzeklis);
- litija preparāti (depresijas ārstēšanai);
- sirds glikozīdi (piemēram, digoksīns);
- antitrombotiskie līdzekļi un selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (depresijas ārstēšanai);
- ciklosporīni un takrolims (imunosupresanti);
- mifepristons;
- zidovudīns (pretvīrusu zāles);
- hinolonu grupas antibiotiski līdzekļi;
- sulfonilurīnvielas atvasinājumi (zāles cukura diabēta ārstēšanai);
- vorikonazols un flukonazols (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai).

Arī citas zāles var ietekmēt Nurofen Express, vai arī tās var ietekmēt šīs citas zāles. Tādēļ pirms Nurofen Express lietošanas kopā ar citām zālēm vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

#### **Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte**

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Nurofen Express grūtniecības pēdējos trīs mēnešos, jo tas var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam vai radīt traucējumus dzemdībās. Tas var izraisīt nieru un sirdsdarbības traucējumus Jūsu nedzimušajam bērnam. Tas var ietekmēt Jūsu un Jūsu bērna noslieci uz asiņošanu un aizkavēt vai pagarināt dzemdības.

Jums nevajadzētu lietot Nurofen Express grūtniecības pirmajos sešos mēnešos, ja vien tas nav absolūti nepieciešams un to nav ieteicis ārsts. Ja Jums ir nepieciešama ārstēšana šajā periodā vai laikā, kad plānojat grūtniecību, jālieto pēc iespējas mazāka deva pēc iespējas īsāku laiku periodu. Ja Nurofen Express lieto ilgāk par dažām dienām sākot no 20. grūtniecības nedēļas, tas var izraisīt nieru darbības traucējumus vēl nedzimušajam bērnam, kas, savukārt, izraisa zemu amnija šķidruma līmeni, kas ieskauj bērnu (oligohidramniju), vai asinsvadu sašaurināšanos (*ductus arteriosus*) bērna sirdī. Ja Jums nepieciešama ārstēšana ilgāka par dažām dienām, ārsts var ieteikt papildu uzraudzību.

Pirms Nurofen Express lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja esat grūtniecības pirmajos 6 mēnešos vai barojat bērnu ar krūti.

Ibuprofēns pieder to zāļu grupai, kas var samazināt sieviešu fertilitāti.

- Auglība atjaunosies normas robežās, kad pārtrauksiet lietot zāles.
- Lietojot ibuprofēnu tikai dažkārt, nav domājams, ka tas traucēs palikt stāvoklī.
- Tomēr pirms ibuprofēna lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir grūtniecības palikt stāvoklī.

Ierobežotos pētījumos ir konstatēts, ka mātes pienā ibuprofēns nonāk ļoti nelielā koncentrācijā, tomēr to nav ieteicams lietot bērna barošanas ar krūti laikā.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Ievērojot ieteiktās devas un terapijas ilgumu, ietekme nav gaidāma.

### **Nurofen Express satur nātriju un saharozi**

Šīs zāles satur 25,72 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā tabletē. Tas ir līdzvērtīgi 1,29% ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

## **3. Kā lietot Nurofen Express**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Tikai īslaicīgai lietošanai.

Jālieto mazākā iedarbīgā deva iespējami īsāku laiku, kas nepieciešama, lai atvieglotu simptomus. Ja Jums ir infekcija, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja tās simptomi (piemēram, drudzis un sāpes) nepāriet vai pasliktinās (skatīt 2. punktu).

### Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma

Iekšķīgai lietošanai.

Lietojiet 1 vai 2 tabletes, uzdzerot glāzi ūdens.

Pēc tam, ja nepieciešams, lietojiet vēl 1 vai 2 tabletes ik pēc 4 stundām.

Jāievēro vismaz 4 stundu intervāls starp devām un nelietojiet vairāk par 6 tabletēm (1200 mg) 24 stundu laikā.

Pacienti ar jutīgu kuņģi zāles jālieto ēšanas laikā vai pēc ēšanas.

Nav piemērotas bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ja pusaudžiem no 12 gadu vecuma zāles jālieto ilgāk par 3 dienām vai simptomi pastiprinās, jākonsultējas ar ārstu.

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās vai parādās jauni simptomi, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Nurofen Express ilgāk par 10 dienām, ja vien ārsts nav ieteicis.

### **Ja esat lietojis Nurofen Express vairāk nekā noteikts**

Ja esat lietojis Nurofen Express vairāk nekā noteikts vai ja bērns ir netīšām norijis zāles, vienmēr

sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai izvērtētu iespējamo risku un saņemtu konsultāciju par turpmāko rīcību.

Iespējamie simptomi var būt slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana (var būt ar asins piejaukumu), galvassāpes, dzīkstēšana ausīs, dezorientācija un spontānas acu ābolu kustības. Lielās devās var izraisīt miegainību, sāpes krūšu kurvī, sirdsklauves, samaņas zudumu, krampjus (galvenokārt bērniem), vājumu un reiboni, asinis urīnā, aukstuma sajūtu un elpošanas traucējumus.

#### 4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk nosaukto nevēlamo blakusparādību saraksts attiecas uz tām blakusparādībām, kas novērotas, ibuprofēnu īslaicīgi lietojot bezrecepšu devās (maksimālā diennakts deva 1200 mg). Ilgstoši ārstējot hroniskus stāvokļus, var rasties vēl arī citas nevēlamas blakusparādības.

Pārtrauciet lietot ibuprofēnu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no tālāk minētajiem simptomiem.

- sarkanīgi, nepacelti, mērķim līdzīgi vai apļveida plankumi uz ķermeņa, bieži ar pūslīšiem centrā, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, uz dzimumorgāniem un acīs. Pirms šādu nopietnu ādas izsitumu parādīšanās, var būt drudzis un gripai līdzīgi simptomi (eksfoliatīvs dermatīts, daudzformu eritēma, Stīvensa–Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze);
- plaši izsitumi, augsta ķermeņa temperatūra un palielināti limfmezgli (DRESS sindroms);
- sarkani, zvīņaini un plaši izsitumi ar izciļņiem zem ādas un pūslīšiem, ko pavada drudzis. Simptomi parasti parādās ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze).

Lietojot Nurofen Express var rasties sekojošas blakusparādības:

##### Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

- Sāpes vēderā, dispepsija, slikta dūša
- Galvassāpes
- Ādas izsitumi
- Nātrene un nieze

##### Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

- Caureja, gāzu uzkrāšanās, aizcietējums, vemšana

##### Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem)

- Kuņģa-zarnu trakta čūlas (dažreiz ar asiņošanu un perforāciju), čūlas mutes dobumā, kuņģa-zarnu trakta traucējumi kā kolīta vai Krona slimības paasinājums
- Aseptiskais meningīts
- Nieru (piemēram, akūta nieru mazspēja) un aknu darbības traucējumi
- Izmaiņas asins ainā (anēmija, leukopēnija, trombocitopēnija, pancitopēnija, agranulocitoze) – to pirmās pazīmes ir drudzis, kakla iekaisums, virspusējas mutes dobuma čūlas, gripai līdzīgi simptomi, izteikts spēku izsīkums un deguna un ādas asiņošana un zilumi
- Pazemināts hemoglobīna līmenis, samazināts urīnvielas nieru klīrenss
- Tādas smagas ādas reakcijas kā Stīvensa–Džonsona sindroms (izpaužas kā bojāta, krevelaina āda ar sarkaniem plankumiem), toksiska epidermas nekrolīze (izpaužas kā ādas augšējā slāņa lobīšanās un čūlas) un daudzformu eritēma (alerģiski izsitumi, kas izskatās kā plakani sarkani punktiņi)
- Smagas vispārējas alerģiskas reakcijas (sejas, mēles un balsenes tūska, elpas trūkums, paātrināta sirdsdarbība, pazemināts asinsspiediens līdz dzīvībai bīstamam šokam)
- Paaugstināts asinsspiediens, tūska, sirds mazspēja

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

- Sāpes krūtīs, kas var liecināt par iespējami nopietnu alerģisku reakciju, ko dēvē par Kounis sindromu.
- Astmas paasinājums un bronhu spazmas, elpceļu reaktivitāte, ieskaitot astmu, aizdusa
- Var rasties smaga ādas reakcija, kas pazīstama kā DRESS sindroms. DRESS sindroma simptomi ietver izsitumus uz ādas, drudzi, limfmezglu pietūkumu un eozinofilu (balto asins šūnu paveids) skaita palielināšanos. Sarkani, zvīņaini un plaši izsitumi ar izciļņiem zem ādas un pūslīšiem, galvenokārt lokalizēti ādas krokās, uz rumpja un augšējām ekstremitātēm, ko pavada drudzis ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze). Ja Jums rodas šie simptomi, pārtrauciet Nurofen Express lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Skatīt arī 2. punktu
- Āda kļūst jutīga pret gaismu

### **Ziņošana par blakusparādībām**

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

## **5. Kā uzglabāt Nurofen Express**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:” vai blistera pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

### **Ko Nurofen Express satur**

- Aktīvā viela ir ibuprofēns. Katra apvalkotā tablete satur 200 mg ibuprofēna, kas atbilst 256 mg ibuprofēna nātrija dihidrāta.
- Citas sastāvdaļas ir:  
Tabletes kodols: kroskarmelozes nātrija sāls (E458), ksilitis (E967), mikrokristāliskā celuloze (E460), magnija stearāts (E572), koloidālais bezūdens silīcija dioksīds (E551).  
Tabletes apvalks: karmelozes nātrija sāls (E466), talkis (E553b), akācijas sveķi (E414), saharoze, titāna dioksīds (E171), makrogols 6000.  
Tabletes apdrukas tinte: melnā apdrukas tinte, satur šellaku, melno dzelzs oksīdu (E 172), propilēnglikolu.

### **Nurofen Express ārējais izskats un iepakojums**

Balta vai gandrīz balta abpusēji izliekta apaļa tablete ar cukura apvalku un melnu apdruku „200” vienā pusē.

Tabletes ir iepakotas izspiežamos, necaurspīdīgas baltas PVH/PVDH/Al folijas blisteros. Blisteri iepakoti kartona kastītē.

Iepakojumi pa 6, 10, 12 un 16 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  
Ul. Okunin 1  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Polija

**Ražotājs**

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207,  
1118 BH Schiphol,  
Nīderlande

SIA ELVIM  
Kurzemes pr. 3G  
Rīga, LV-1067  
Latvija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA ELVIM  
Kurzemes pr. 3G  
Rīga, LV-1067  
Latvija  
Tel.: +371 67808450  
Fakss: +371 67808451

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2024**