

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Brufen 800 mg ilgstošās darbības tabletes

ibuprofenum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiēt šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējiēt ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Brufen un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Brufen lietošanas
3. Kā lietot Brufen
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Brufen
6. Iepakojuma saturs un informācija

1. Kas ir Brufen un kādam nolūkam to lieto

Brufen satur aktīvo vielu ibuprofēnu un pieder zāļu grupai, ko sauc par NPL (nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem). Brufen atvieglo sāpes, mazina augstu temperatūru un darbojas pret iekaisumu.

Brufen lieto simptomātiskai sāpju un iekaisuma ārstēšanai reimatisko slimību (reimatoīdā artrīta un osteoartrīta) gadījumā pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 līdz 18 gadu vecumam, 40 kg un vairāk).

2. Kas Jums jāzina pirms Brufen lietošanas

Nelietojiet Brufen šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret ibuprofēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums ir kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla, vai ir bijusi čūlas atkārtšanās, vai asiņošana kuņģī vai zarnās,
- ja Jums ir smaga aknu vai nieru slimība,
- ja Jums ir smaga sirds mazspēja,
- ja Jums ir pastiprināta nosliece uz asiņošanu,
- ja Jums iepriekš bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana vai plīsums, kad ārstējāties ar Brufen vai līdzīgām zālēm (citiem NPL),
- ja Jums ir pēdējie trīs grūtniecības mēneši,
- ja Jums bijušas alerģiskas reakcijas (piemēram, apgrūtināta elpošana, aizlikts deguns, izsitumi) pret acetilsalicilskābi vai citiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).

Nelietojiet Brufen, ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējiēt ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Brufen lietošanas konsultējiēt ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir astma, hroniskas iesnas (hroniski aizlikts vai tekošs deguns) vai alerģiskas reakcijas, jo šādos gadījumos Brufen var izraisīt elpošanas grūtības, nātreni vai smagu alerģisku reakciju.

- ja Jums ir specifiskas imūnās sistēmas slimības (jauktas saistaudu slimības un sistēmas sarkanā vilkēde, saistaudus ietekmējošas imūnās sistēmas slimības, kas izraisa locītavu sāpes, ādas pārmaiņas un citu orgānu traucējumi), jo var būt paaugstināts aseptiska meningīta risks.
- ja Jums ir traucēta nieru vai aknu darbība.
- ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram, sirds mazspēja, stenokardija (sāpes krūšu kurvī), vai ir bijusi sirdstrieka, šunta operācija, perifēro artēriju slimība (slikta asins cirkulācija kājās vai pēdās šauru vai bloķētu artēriju dēļ) vai jebkāda veida trieka (insults) (tostarp “mini trieka” jeb pārejošas išēmiskas lēkmes (TIL)).
- ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens, diabēts, augsts holesterīna līmenis, ģimenē ir bijušas sirds slimības vai insults, vai smēķējat.
- ja Jums ir iekaisīga zarnu slimība, ir bijusi kuņģa čūla vai pastiprināta nosliece uz asiņošanu.
- ja Jums ir dehidratācija, jo pastāv nieru darbības traucējumu risks, it īpaši dehidratētiem pusaudžiem un gados vecākiem pacientiem.
- ja Jums ir infekcija - lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Pirms Brufen lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums.

Nelietojiet Brufen, ja plānojat grūtniecību. Vispirms konsultējieties ar savu ārstu. Skatīt arī punktu „Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte”.

Šīs zāles pieder zāļu grupai (NPL), kas sievietēm var izraisīt auglības traucējumus. Tie ir atgriezeniski, pārtraucot zāles lietot. Skatīt arī punktu „Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte”.

Mazākā efektīvā deva

Vienmēr centieties lietot mazāko iespējamo devu iespējami īsāku laiku, lai mazinātu blakusparādību risku. Parasti devu, kas pārsniedz ieteiktās, lietošana saistīta ar risku. Tas arī nozīmē, ka ir jāizvairās no vairāku NPL vienlaicīgas lietošanas.

Ja Jūs ilgstoši lietojat pretsāpju zāles, tas var izraisīt galvassāpes, ko nedrīkst ārstēt ar papildu pretsāpju zālēm. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja domājat, ka iepriekš minētais attiecas uz Jums.

Sirdstrieka un insults

Tādu pretiekaisuma/pretsāpju zāļu kā ibuprofēns lietošana var būt saistīta ar nelielu paaugstinātu sirdstriekas vai triekas (insulta) risku, it īpaši lietojot lielās devās. Nepārsniedziet ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu.

Lietojot ibuprofēnu, ir ziņots par alerģiskas reakcijas pazīmēm pret šīm zālēm, tostarp elpošanas traucējumiem, sejas un kakla zonas pietūkumu (angioedēma), sāpēm krūtīs. Nekavējoties pārtrauciet Brufen lietošanu un sazinieties ar ārstu, vai meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no šīm pazīmēm.

Gastrointestināla asiņošana, čūlas un perforācija

Pacientiem, kuriem agrāk bijuši kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, īpaši gados vecākiem pacientiem, jāsažinās ar ārstu, ja rodas simptomi vēderā (sevišķi gastrointestināla asiņošana), īpaši ārstēšanas sākumā.

Ja pacientam, ārstēšanās ar Brufen laikā, sākas gastrointestināla asiņošana vai rodas čūla, ārstēšana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ādas reakcijas

Saistībā ar ibuprofēna lietošanu ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, tostarp eksfoliatīvu dermatītu, daudzformu eritēmu, Stīvensa-Džonsona sindromu, toksisku epidermas nekrolīzi, zāļu izraisītu reakciju ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS), akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AGEP). Nekavējoties pārtrauciet Brufen lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no 4. punktā aprakstītajiem simptomiem, kas saistīti ar šīm nopietnajām ādas reakcijām.

Infekcijas

Brufen ilgstošās darbības tabletes var slēpt infekciju pazīmes, piemēram, drudzi un sāpes. Tāpēc iespējams, ka Brufen ilgstošās darbības tablešu lietošanas dēļ var tikt kavēta infekcijas atbilstošas ārstēšanas uzsākšana, un tas var paaugstināt komplikāciju risku. Tas novērots baktēriju izraisītas pneimonijas (plaušu karsoņa) un ar vējbakām saistītu bakteriālu ādas infekciju gadījumā. Ja Jūs lietojat

šīs zāles, kamēr Jums ir infekcija, un infekcijas simptomi nepāriet vai pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Vējbaku gadījumā ieteicams izvairīties no Brufen lietošanas.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem jāapzinās, ka tiem ir lielāks nevēlamo blakusparādību risks, īpaši gremošanas trakta asiņošanas un perforācijas, kas var būt letāla.

Bērni un pusaudži

Brufen nav piemērots lietošanai bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem.

Pusaudžiem ar dehidratāciju ir nieru bojājumu risks.

Citas zāles un Brufen

Nelietojiet vienlaikus dažādas pretsāpju zāles, ja vien to nav ieteicis ārsts.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Brufen var ietekmēt citu zāļu iedarbību, vai arī to var ietekmēt citu zāļu iedarbība. Piemēram, šādu slimību ārstēšanai/novēršanai:

- audzēji un imūnsistēmas traucējumi (metotreksāts),
- maniakāli depresīvā psihoze (litījs),
- neregulārs sirds ritms (digoksīns),
- sāpes (acetilsalicilskābe),
- trombemboliski traucējumi (antikoagulanti, t.i., asins šķīdināšanai/trombu veidošanās novēršanai paredzētas zāles, piem., aspirīns/acetilsalicilskābe, dikumarols, varfarīns, tiklopidīns),
- depresija (zāles, ko sauc par SSAI – selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori),
- augsts asinsspiediens (zāles, kas pazemina augstu asinsspiedienu, piem., ACE inhibitori, piemēram, kaptoprils; bēta blokatori, piemēram, atenololu saturošas zāles; angiotensīna II receptoru antagonisti, piemēram, losartāns; diurētiskie līdzekļi),
- atgrūšanas reakcija pacientiem, kam ir pārstādīts orgāns (zāles, kas nomāc imūnsistēmu, piemēram, ciklosporīns vai takrolīms),
- iekaisums (kortikosteroīdi),
- bakteriālas infekcijas (dažas antibiotikas ieskaitot aminoglikozīdus),
- sēnīšu infekcijas (piemēram, vorikonazols vai flukonazols),
- diabēts (sulfonilurīnvielas atvasinājumi),
- augsts holesterīna līmenis (holestiramīns),
- cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija (zidovudīns).

Arī citas zāles var ietekmēt Brufen, vai arī tas var ietekmēt šīs citas zāles. Tādēļ pirms Brufen lietošanas ar citām zālēm vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brufen kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Brufen var lietot kopā ar uzturu un dzērieniem. Ja Brufen lieto kopā ar alkoholu, blakusparādības var pastiprināties.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Nelietojiet Brufen pēdējos trīs grūtniecības mēnešos, jo tas var kaitēt nedzimušajam bērnam vai izraisīt sarežģījumus dzemdībās. Tas var izraisīt nieru un sirdsdarbības problēmas Jūsu nedzimušajam bērnam. Tas var ietekmēt Jūsu un Jūsu bērna noslieci uz asiņošanu un aizkavēt vai pagarināt dzemdības.

Grūtniecības pirmajos 6 mēnešos Brufen būtu jālieto tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams un saskaņots ar ārstu. Ja Jums šajā laika periodā nepieciešama ārstēšana vai plānojat grūtniecību, devai jābūt iespējami mazākajai efektīvajai un ārstēšanas periodam iespējami īsākai. Ja Brufen lieto ilgāk par dažām dienām, sākot no 20. grūtniecības nedēļas, tas var izraisīt nieru darbības traucējumus vēl nedzimušajam bērnam, kas savukārt izraisa zemu amnija šķidruma līmeni, kas ieskauj bērnu (oligohidramniju), vai asinsvadu sašaurināšanos (*ductus arteriosus*) bērna sirdī. Ja Jums nepieciešama ārstēšana ilgāka par dažām dienām, ārsts var ieteikt papildu uzraudzību.

Barošana ar krūti

Ibuprofēns nonāk mātes pienā, bet maz ticams, ka tas varētu ietekmēt bērnu, ko baro ar krūti, ja to ārstēšanai lieto īslaicīgi. Tomēr, ja barošanas ar krūti periodā nepieciešams lietot vairāk Brufen nekā tikai reizēm, konsultējieties ar ārstu.

Fertilitāte

Ibuprofēna lietošana var ietekmēt auglību. Ibuprofēna lietošana nav ieteicama sievietēm, kuras mēģina ieņemt bērnu vai neauglības izmeklēšanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažiem cilvēkiem Brufen var pavājināt spēju reaģēt, piemēram, tādu blakusparādību dēļ kā redzes traucējumi, reibonis un miegainība. Tas jāņem vērā gadījumos, kad nepieciešama liela modrība, piemēram, vadot automašīnu, īpaši kombinācijā ar alkoholu.

3. Kā lietot Brufen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Jālieto mazākā iedarbīgā deva iespējami īsāku laiku, kas nepieciešama, lai atvieglotu simptomus. Ja Jums ir infekcija, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja tās simptomi (piemēram, drudzis un sāpes) nepāriet vai pasliktinās (skatīt 2. punktu).

Pieaugušie un pusaudži pēc 12 gadu vecuma (40 kg un vairāk)

Ieteicamā deva ir 2 tabletes katru vakaru (iespējams lietot 1 tableti no rīta, 2 vakarā). Maksimālā dienas deva ir 3 tabletes (2400 mg). Lai palīdzētu izvairīties no pārejošas dedzināšanas sajūtas rīklē un mutē, tabletes jānorij *veselas*, uzdzerot vismaz pus glāzi ūdens.

Ja Jums ir jutīgs kuņģis, lietojiet Brufen ar uzturu.

Ja Jums ir smaga aknu un nieru slimība vai esat gados vecāks pacients, ārsts Jums pateiks pareizo devu lietošanai, kas būs iespējami mazākā deva.

Lietošana bērniem

Brufen nav piemērots lietošanai bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem.

Ja esat lietojis Brufen vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Brufen vairāk nekā noteikts vai, ja bērns ir netīšām norijis zāles, vienmēr sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai izvērtētu iespējamo risku un saņemtu konsultāciju par turpmāko rīcību.

Iespējamie simptomi var būt slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana (var būt ar asins piejaukumu), galvassāpes, dzīkstēšana ausīs, dezorientācija un spontānas acu ābolu kustības. Lielās devās var izraisīt miegainību, sāpes krūšu kurvī, sirdsklauves, samaņas zudumu, krampjus (galvenokārt, bērniem), vājumu un reiboni, asinis urīnā, aukstuma sajūtu un elpošanas traucējumus.

Ja esat aizmirsis lietot Brufen

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet Brufen lietošanu un sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas jebkas no tālāk minētā:

- angioedēma (retāk sastopama blakusparādība) ar šādiem simptomiem:
 - sejas, mēles vai kakla pietūkums,
 - apgrūtināta rīšana,
 - izsitumi un apgrūtināta elpošana.
- infekcija ar tādām pazīmēm kā drudzis un ievērojama vispārējā stāvokļa pasliktināšanās vai drudzis ar tādām vietējas infekcijas pazīmēm kā iekaisis kakls/balsene/mute vai urīnceļu problēmas. Brufen var samazināt balto asins šūnu skaitu (agranulocitoze) un samazināt Jūsu spēju pretoties infekcijām (retāka blakusparādība). Ir svarīgi informēt ārstu par Jūsu zālēm.
- ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, piemēram toksisko epidermas nekrolīzi un/vai daudzformu eritēmu (ļoti reta blakusparādība). Turklāt var rasties smaga ādas reakcija, kas pazīstama kā DRESS sindroms. DRESS sindroma simptomi ietver izsitumus uz ādas, drudzi, limfmezglu pietūkumu un eozinofilu (balto asins šūnu paveids) skaita palielināšanos. Ja Jums rodas izsitumi vai gļotādu bojājumi **pārtrauciet Brufen lietošanu un konsultējieties ar ārstu.** Nopietni izsitumi ir čūlas uz ādas, it īpaši uz kājām, rokām, plaukstām un pēdām, arī uz sejas un lūpām. Tas var arī pasliktināties, čūlām palielinoties un izplatoties un ādai daļēji loboties (toksiskā epidermas nekrolīze). Var arī rasties smaga infekcija ar ādas, zemādas audu un muskuļu atmiršanu (nekrozi).
- sarkani, zvīņaini un plaši izsitumi ar izciļņiem zem ādas un pūslīšiem, galvenokārt lokalizēti ādas krokās, uz rumpja un augšējām ekstremitātēm, ko pavada drudzis ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze). Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Skatīt arī 2. punktu.
- sāpes krūtīs, kas var liecināt par potenciāli nopietnu alerģisku reakciju, ko sauc par Kounis sindromu. Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Citas blakusparādības, kas var rasties:

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

- Galvassāpes, viegls reibonis
- Kuņģa-zarnu trakta blakusparādības (gremošanas traucējumi, caureja, slikta dūša, vemšana, vēdera sāpes, meteorisms, aizcietējumi, melni izkārnījumi, asiņošana kuņģī un zarnās, vemšana ar asinīm)
- Nogurums
- Izsitumi

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

- Iesnas
- Paaugstināta jutība
- Bezmiegs, trauksme
- Redzes traucējumi, dzirdes traucējumi
- Bronhu spazmas, astma
- Čūlas mutē
- Kuņģa čūla, zarnu čūla, kuņģa čūlas plīsums, kuņģa gļotādas iekaisums
- Hepatīts, dzelte, aknu darbības traucējumi
- Nieze, sīki asinsizplūdumi ādā un gļotādās

- Pastiprināta jutība pret gaismu
- Traucēta nieru darbība
- Asins šūnu skaita izmaiņas
- Anēmija (sarkano asins šūnu skaita vai hemoglobīna samazināšanās asinīs), kas padara ādu bālu un var izraisīt vājumu
- Miegainība
- Tirpšanas sajūta
- Dzirdes zudums

Reti (var ietekmēt līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

- Nebakteriāls meningīts
- Alerģiska reakcija
- Depresija, apjukums
- Redzes traucējumi, tinnīts (zvanīšana ausīs), reibonis
- Aknu bojājums un šķidruma aizture organismā

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

- Aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu mazspēja

Nav zināms (biežums nav nosakāms pēc pieejamajiem datiem)

- Čūlu paasinājums resnajā zarnā (kolīts un Krona slimība (zarnu slimība))
- Sirds mazspēja, sirdstrieka, paaugstināts asinsspiediens

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Brufen var pagarināt asins teces laiku.

Atsevišķas smagas ādas infekcijas vējbaku gadījumā.

Lietojot NPL var attīstīties vai saasināties ar infekciju saistīts ādas iekaisums (var attīstīties tāds stāvoklis kā nekrotizējošs fascīts, kam raksturīgas stipras sāpes, drudzis ar augstu temperatūru, pietūkusi un karsta āda, čulgu veidošanās un nekroze). Ja Brufen lietošanas laikā parādās ādas infekcijas pazīmes vai stāvoklis pasliktinās, tad nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Brufen līdzīgas zāles var radīt nelielu palielinātu sirdstriekas vai triekas risku.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Brufen

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Blisteris: Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Plastmasas pudele: Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Brufen satur

- Aktīvā viela ir ibuprofēns. Viena ilgstošās darbības tablete satur 800 mg ibuprofēna.
- Citas sastāvdaļas ir: ksantāna sveķi, povidons, stearīnskābe, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, talks, hipromeloze, titāna dioksīds (E171).

Brufen ārējais izskats un iepakojums

Balta, ovāla, apvalkota, ilgstošās darbības tablete.

30 tabletes (blisterī)

100 tabletes (plastmasas pudelē)

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Viatis Healthcare Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Īrija

Ražotājs

FAMAR A.V.E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, Anthoussa Attiki, 153 49 Grieķija

Šīs zāles ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ar šādiem nosaukumiem:

Valsts	Zāļu nosaukums
Bulgārija	Brufen Retard 800mg prolonged release tablets
Kipra	Brufedol 800 mg prolonged-release tablets
Igaunija	Brufen, 800 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Grieķija	Brufedol 800 mg prolonged-release tablets
Ungārija	Brufen 800 mg retard tabletta
Latvija	Brufen 800 mg ilgstošās darbības tabletes
Lietuva	Brufen 800 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Malta	Brufen Retard 800 mg prolonged release tablets
Rumānija	Brufen Retard 800 mg comprimate cu eliberare prelungită
Slovēnija	Brufen retard 800 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Zviedrija	Brufen Retard 800 mg depottabletter

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2024.