

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Omeprazole Olainfarm 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

omeprazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Omeprazole Olainfarm un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas
3. Kā lietot Omeprazole Olainfarm
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Omeprazole Olainfarm
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Omeprazole Olainfarm un kādam nolūkam to lieto

Omeprazole Olainfarm satur aktīvo vielu omeprazolu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par „protonu sūkņa inhibitoriem”. Šīs zāles iedarbojas, samazinot kuņķa izdalītās skābes daudzumu.

Omeprazole Olainfarm lieto, lai ārstētu šādus stāvokļus:

Pieaugušajiem:

- „gastroezofageālā atviļņa slimību” (GEAS). Šīs slimības gadījumā kuņķa skābe iekļūst barības vadā (cauruļveida orgāns, kas savieno rīkli un kuņķi), izraisot sāpes, iekaisumu un grēmas; čūlas zarnu trakta sākuma daļā (divpadsmitsirkstu zarnas čūlu) vai kuņģī (kuņķa čūlu);
- ar baktērijām, ko sauc par „*Helicobacter pylori*”, inficētas čūlas. Ja Jums ir šis stāvoklis, ārsts var nozīmēt arī antibiotiskos līdzekļus, lai ārstētu šo infekciju un ļautu čūlai sadzīt;
- zāļu, ko sauc par NPL jeb nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, izraisītas čūlas. Omeprazole Olainfarm var lietot, arī lai apturētu čūlu veidošanos, ja lietojat NPL;
- pārāk lielu skābes daudzumu kuņģī, ko izraisījis aizkuņķa dziedzera audzējs (Zolindžera-Elisona sindroms).

Bērniem:

Bērniem no 1 gada vecuma un ar ķermeņa masu $\geq 10 \text{ kg}$

- „gastroezofageālā atviļņa slimību” (GEAS). Šīs slimības gadījumā kuņķa skābe iekļūst barības vadā (cauruļveida orgāns, kas savieno rīkli un kuņķi), izraisot sāpes, iekaisumu un grēmas. Bērniem iespējamie šī stāvokļa simptomi ir kuņķa satura nonākšana atpakaļ mutē (skābes atviņis), sliktā dūša (vemšana) un lēna pieņemšanās svarā.

Bērniem no 4 gadu vecuma un pusaudžiem

- ar baktērijām, ko sauc par „*Helicobacter pylori*”, inficētas čūlas. Ja Jūsu bērnam ir šis stāvoklis, ārsts var nozīmēt arī antibiotiskos līdzekļus, lai ārstētu šo infekciju un ļautu čūlai sadzīt.

2. Kas Jums jāzina pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas

Nelietojiet Omeprazole Olainfarm šādos gadījumos

- ja Jums ir alergija pret omeprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir alergija pret citām protonu sūkņa inhibitorus saturošām zālēm (piemēram, pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu, esomeprazolu);
- ja lietojat nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Ja Jums ir kādas šaubas, pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Omeprazole Olainfarm var maskēt citu slimību simptomus. Tādēļ tad, ja pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas vai tās laikā ar Jums noticis kaut kas no turpmāk minētā, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu:

- Jūs bez iemesla zaudējat daudz svara un Jums ir rīšanas traucējumi;
- Jums parādās sāpes vēderā vai gremošanas traucējumi;
- Jūs sākat atvemt uzturu vai asinis;
- Jums ir melni izkārnījumi (izkārnījumi ar asins piejaukumu);
- Jums ir smaga vai nepārejoša caureja, jo omeprazola lietošana ir bijusi saistīta ar nelielu infekcīozās caurejas sastopamības palielināšanos;
- Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.
- Jums kādreiz ir bijusi ādas reakcija pēc ārstēšanās ar Omeprazole Olainfarm līdzīgām zālēm, kas samazina kuņķa skābi.

Lietojot omeprazolu, var rasties nieru iekaisums. Iespējamās pazīmes un simptomi var būt samazināts urīna tilpums vai asinis urīnā, un/vai paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, drudzis, izsitumi un locītavu stīvums. Par šādām pazīmēm jāziņo ārstējošajam ārstam.

Ja Jums uz ādas rodas izsitumi, it īpaši vietās, kas ir pakļautas saules gaismas iedarbībai, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu, jo ārstēšana ar Omeprazole Olainfarm var būt jāpārtrauc. Atcerieties pieminēt citas nevēlamas blakusparādības, piemēram, sāpes locītavās.

Pastāstiet ārstam pirms šo zāļu lietošanas, ja Jums ir jāveic specifiska asinsanalīze (hromogranīna A noteikšanai).

Ja Jūs Omeprazole Olainfarm lietojat ilgstoši (ilgāk par 1 gadu), iespējams, ka ārsts Jūs regulāri novēros. Vienmēr, kad Jūs esat pie sava ārsta, Jums ārsts jāinformē par visiem jaunajiem un ārkārtējiem simptomiem un to parādīšanās apstākļiem.

Protonu sūkņa inhibitoru, piemēram, Omeprazole Olainfarm lietošana, it īpaši ilgāk par vienu gadu, var nedaudz palielināt gūžas, plaukstas pamatnes vai mugurkaula lūzumu risku. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir osteoporoze vai ja Jūs lietojat kortikosteroīdus (kas var palielināt osteoporozes risku).

Ārstēšanās ar omeprazolu var ietekmēt asins analīžu rezultātus. Ja Jums ir ņemti asins paraugi analīžu veikšanai, pastāstiet savam ārstam par to, ka lietojat Omeprazole Olainfarm.

Citas zāles un Omeprazole Olainfarm

Pastāstiet ārstam vai farmaceutam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Tas nepieciešams tādēļ, ka Omeprazole Olainfarm var ietekmēt dažu zāļu iedarbību un dažas zāles var ietekmēt Omeprazole Olainfarm iedarbību.

Nelietojiet Omeprazole Olainfarm, ja lietojat **nelfinavīru** saturošas zāles (lieto HIV infekcijas

ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm:

- posakonazolu, ketokonazolu, itrakonazolu vai vorikonazolu (lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai);
- digoksīnu (lieto sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai);
- diazepāmu (lieto spriedzes ārstēšanai, muskuļu atslābināšanai vai epilepsijas gadījumā);
- fenitoīnu (lieto epilepsijas gadījumā). Ja lietojat fenitoīnu, laikā, kad sāksiet vai pārtrauksiet Omeprazole Olainfarm lietošanu, ārstam var būt nepieciešams Jūs novērot;
- zāles, ko lieto asins šķidrināšanai, piemēram, varfarīnu vai citus K vitamīna blokatorus. Laikā, kad sāksiet vai pārtrauksiet Omeprazole Olainfarm lietošanu, ārstam var būt nepieciešams Jūs novērot;
- rifampicīnu (lieto tuberkulozes ārstēšanai);
- atazanavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);
- takrolimu (lieto orgānu transplantācijas gadījumos);
- divšķautņu asinszāli (*Hypericum perforatum*) saturošus līdzekļus (lieto vieglas depresijas ārstēšanai);
- cilostazolu (lieto mijklībošanas ārstēšanai);
- sahinavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);
- klopидogrelu (lieto asins trombu (recekļu) veidošanās profilaksei);
- erlotinibu (lieto vēža slimības ārstēšanai);
- metotreksātu (ķīmijterapijas zāles, ko lieto lielās devās vēža ārstēšanai). Ja Jūs lietojat lielas metotreksāta devas, ārsts var uz laiku pārtraukt ārstēšanu ar Omeprazole Olainfarm.

Ja ārsts *Helicobacter pylori* infekcijas izraisītu čūlu ārstēšanai vienlaikus ir nozīmējis antibiotiskos līdzekļus - amoksicilīnu un klaritromicīnu, kā arī Omeprazole Olainfarm, ir ļoti svarīgi pastāstīt savam ārstam par visām citām zālēm, ko lietojat.

Omeprazole Olainfarm kopā ar uzturu

Kapsulas var lietot kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja plānojat grūtniecību, pirms Omeprazole Olainfarm lietošanas pastāstiet par to savam ārstam. Ārsts izlems, vai šajā laikā Jums atļauts lietot Omeprazole Olainfarm.

Barošana ar krūti

Ja barojat bērnu ar krūti, ārsts izlems, vai šajā laikā Jums atļauts lietot Omeprazole Olainfarm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Omeprazole Olainfarm varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli, apkalpot mehānismus vai strādāt ar instrumentiem. Iespējamas tādas blakusparādības kā reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4. punktu). Ja Jūs skārušas minētās parādības, Jums nevajadzētu vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Omeprazole Olainfarm satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Omeprazole Olainfarm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceijs Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts Jums pateiks, cik daudz kapsulu Jums jālieto un cik ilgi tās jālieto. Tas būs atkarīgs no Jūsu stāvokļa un vecuma.

Turpmāk norādītas ieteicamās devas.

Lietošana pieaugušajiem

GEAS simptomu, piemēram, **grēmu un skābes atvilņa** ārstēšanai:

- Ja ārsts Jums ir konstatējis vieglus barības vada bojājumus, parastā deva ir 20 mg vienu reizi dienā, kas jālieto 4-8 nedēļas. Ja barības vads vēl nebūs sadzījis, ārsts Jums var nozīmēt vēl 8 nedēļas lietot 40 mg lielu devu.
- Pēc barības vada sadzīšanas parastā deva ir 10 mg omeprazola vienu reizi dienā (šajā gadījumā jālieto citas mazāka stipruma omeprazolu saturošas zāles).
- Ja Jums nav barības vada bojājumu, parastā deva ir 10 mg omeprazola vienu reizi dienā (šajā gadījumā jālieto citas mazāka stipruma omeprazolu saturošas zāles).

Lai ārstētu **čūlas zarnu trakta sākuma daļā** (divpadsmitpirkstu zarnas čūlu):

- Parastā deva ir 20 mg vienu reizi dienā, kas jālieto 2 nedēļas. Ja čūla vēl nebūs sadzījusi, ārsts Jums var nozīmēt to pašu devu lietot vēl 2 nedēļas.
- Ja šī čūla vēl nebūs pilnīgi sadzījusi, šo devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā uz 4 nedēļām.

Lai ārstētu **čūlas kuņģī** (kuņģa čūlas):

- Parastā deva ir 20 mg vienu reizi dienā, kas jālieto 4 nedēļas. Ja čūla vēl nebūs sadzījusi, ārsts Jums var nozīmēt to pašu devu lietot vēl 4 nedēļas.
- Ja šī čūla vēl nebūs pilnīgi sadzījusi, šo devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā uz 8 nedēļām.

Divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlu atkārtošanās profilaksei:

- Parastā deva ir 10 mg vai 20 mg omeprazola vienu reizi dienā. Lai iegūtu 10 mg devu, jālieto citas, mazāka stipruma omeprazolu saturošas zāles. Ārsts šo devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā.

Lai ārstētu **NPL** (nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu) **lietošanas izraisītas** divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlas:

- Parastā deva ir 20 mg vienu reizi dienā, kas jālieto 4-8 nedēļas.

Divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlu profilaksei, ja Jūs lietojat NPL:

- Parastā deva ir 20 mg vienu reizi dienā.

Lai ārstētu ***Helicobacter pylori*** infekcijas **izraisītas čūlas** un nepieļautu to atkārtošanos:

- Parastā Omeprazole Olainfarm deva ir 20 mg divas reizes dienā, kas jālieto vienu nedēļu.
- Ārsts Jums nozīmēs lietot arī divus no šiem antibiotiskajiem līdzekļiem – amoksicilīnu, klaritromicīnu vai metronidazolu.

Lai ārstētu pārāk lielu skābes daudzumu kuņģī, ko izraisījis **aizkuņģa dziedzera audzējs (Zolindžera-Elisona sindroms)**:

- Parastā deva ir 60 mg dienā.
- Ārsts devu pielāgos atbilstoši Jūsu vajadzībām, kā arī lems par to, cik ilgi Jums šīs zāles jālieto.

Gados vecāki pacienti (vecāki par 65 gadiem)

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pirms šo zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošana bērniem

GEAS simptomu, piemēram, **grēmu un skābes atvilņa** ārstēšanai:

- Omeprazole Olainfarm drīkst lietot bērni no 1 gada vecuma un ar ķermeņa masu lielāku par 10 kg. Bērna deva ir atkarīga no viņa ķermeņa masas un par pareizo devas lielumu izlems ārsts.

Lai ārstētu *Helicobacter pylori* infekcijas **izraisītas čūlas** un nepieļautu to atkārtošanos:

- Omeprazole Olainfarm drīkst lietot bērni no 4 gadu vecuma. Bērna deva ir atkarīga no viņa ķermeņa masas un par pareizo devas lielumu izlems ārsts.
- Ārsts Jūsu bērnam nozīmēs arī divus antibiotiskos līdzekļus, ko sauc par amoksicilīnu un klaritromicīnu.

Šo zāļu lietošana

- Šīs zāles ieteicams lietot no rīta.
- Tās var lietot kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.
- Kapsula jānorīj vesela, uzdzerot pusglāzi ūdens. Kapsulu nedrīkst sakošķāt un sasmalcināt. Tas nepieciešams tāpēc, ka šī kapsula satur apvalkotas lodītes, kas nepieļauj šo zāļu noārdīšanos kūnā skābes ietekmes rezultātā. Ir svarīgi šīs lodītes nesabojāt.

Kā rīkoties, ja Jums vai Jūsu bērnam ir grūti norīt šīs kapsulas

- Ja Jums vai Jūsu bērnam ir grūti norīt šīs kapsulas:
 - kapsula jāatver un tās saturs jālieto nekavējoties, uzdzerot pusglāzi ūdens, vai arī kapsulas saturs jāsajauj ar nelielu daudzumu jogurta, jebkādu skābu augļu (piemēram, ābolu, apelsīnu vai ananāsu) sulu vai ābolu biezeni;
 - šo maisījumu tieši pirms dzeršanas vienmēr samaisiet (maisījums nebūs dzidrs). Pēc tam šo maisījumu izdzeriet nekavējoties vai 30 minūšu laikā;
 - lai būtu droši, ka esat izdzēris visas zāles, glāzi ļoti labi izskalojiet ar pusglāzi ūdens un to izdzeriet. Cietie gabaliņi satur zāles – nesakošķājiet un nesasmalciniet tos.

Ja esat lietojis Omeprazole Olainfarm vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Omeprazole Olainfarm vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Omeprazole Olainfarm

Ja esat aizmirsis lietot devu, izdariet to, tiklīdz par to atceraties. Tomēr, ja jau gandrīz ir pienācis laiks lietot nākamo devu, izlaidiet aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums novērojama kāda no turpmāk minētajām retajām, bet nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Omeprazole Olainfarm lietošanu un sazinieties ar savu ārstu:

- pēkšņa sēkšana, lūpu, mēles un rīkles vai ķermeņa tūska, izsitumi, gībonis vai apgrūtināta rīšana (smaga alergiska reakcija);
- ādas apsārtums ar pūslīšiem vai ādas lobīšanos. Iespējami arī ļoti izteikti pūslīši uz lūpām, ap acīm, mutes dobumā, degunā un uz dzimumorgāniem, kā arī to asiņošana. Tas varētu būt „Stīvensa-Džonsona sindroms” vai „toksiska epidermas nekrolīze”;
- dzeltenīga ādas nokrāsa, tumšas krāsas urīns un noguruma sajūta, kas var būt aknu darbības traucējumu simptomi.

Citas blakusparādības ir:

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 lietotāju no 10):

- galvassāpes;
- kuņķa vai zarnu trakta reakcijas: caureja, sāpes vēderā, aizcietējums, gāzu uzkrāšanās (meteorisms);
- slikta dūša vai vemšana;
- labdabīgi polipi kuņģī.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 lietotāju no 100):

- pēdu un potīšu tūska;
- miega traucējumi (bezmiegs);
- reibonis, tirpšanas sajūtas, piemēram, durstīšanas sajūta, miegainības sajūta;
- griešanās sajūta (vertigo);
- aknu darbību raksturojošo asins analīžu rezultātu izmaiņas;
- izsitumi uz ādas, reljefi izsitumi (nātrene) un ādas nieze;
- slikta vispārējā pašsajūta un energijas trūkums;
- gūžas, plaukstas pamatnes vai mugurkaula lūzums (ja Omeprazole Olainfarm lieto ilgstoši lielā devā).

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 lietotāju no 1 000):

- asins sastāva pārmaiņas, piemēram, samazināts leikocītu vai trombocītu skaits. Tas var izraisīt vājumu, zilumu veidošanos un palielināt infekciju iespēju;
- alergiskas reakcijas, dažkārt ļoti smagas, tostarp arī lūpu, mēles un rīkles tūska, drudzis, sēkšana;
- zema nātrija koncentrācija asinīs. Tā var izraisīt vājumu, vemšanu un krampjus;
- uzbudinājuma, apjukuma vai depresijas sajūta;
- garšas sajūtas izmaiņas;
- redzes traucējumi, piemēram, neskaidra redze;
- pēkšņa sēkšana vai elpas trūkuma sajūta (bronhospazmas);
- mutes sausums;
- iekaisums mutes dobumā;
- sēnīšu izraisīta infekcija, ko sauc par „piena sēnīti” un kas var skart zarnu traktu;
- aknu darbības traucējumi, tostarp arī dzelte, kas var radīt dzeltenīgu ādas nokrāsu, tumšas krāsas urīnu un noguruma sajūtu;
- matu izkrišana (alopēcija);
- izsitumi uz ādas saules iedarbības rezultātā;
- locītavu sāpes (artralģija) vai muskuļu sāpes (mialģija);
- smagi nieru darbības traucējumi (intersticiāls nefrīts);
- pastiprināta svīšana;
- resnās zarnas iekaisums (mikroskopisks kolīts).

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000):

- asinsainas izmaiņas, tostarp arī agranulocitoze (balto asins šūnu deficitis);
- agresivitāte;
- neesošu lietu redzēšana, sajušana vai dzirdēšana (halucinācijas);
- smagi aknu darbības traucējumi, kas izraisa aknu mazspēju un smadzeņu iekaisumu;

- pēkšņi smagi izsitumi vai pūslīši uz ādas vai ādas lobīšanās. Minētais var būt saistīts ar stipru drudzi un locītavu sāpēm (*erythema multiforme*, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze);
- muskuļu vājums;
- krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem.

Ļoti retos gadījumos Omeprazole Olainfarm var ietekmēt baltās asins šūnas, izraisot imūndeficītu. Ja Jums ir infekcija ar tādiem simptomiem kā, piemēram, drudzis kopā ar **nopietnu** vispārējā stāvokļa pasliktināšanos vai drudzis kopā ar lokālas infekcijas simptomiem, piemēram, sāpēm kaklā, rīklē vai mutē vai urinācijas traucējumiem, Jums pēc iespējas drīzāk jākonsultējas ar savu ārstu, lai ar asins analīžu palīdzību būtu iespējams izslēgt balto asins šūnu deficitu (agranulocitozi). Ir svarīgi pastāstīt, kādas zāles pašlaik lietojat.

Nav zināms (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- ja Jūs lietojat Omeprazole Olainfarm ilgāk nekā 3 mēnešus, pastāv iespēja, ka Jums var pazemināties magnija līmenis asinīs. Samazināts magnija līmenis var izpausties kā nogurums, patvalīgas muskuļu kontrakcijas, dezorientācija, krampji, reibonis, paātrināta sirdsdarbība. Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet par to ārstam. Zems magnija līmenis var radīt arī kālija vai kalcija līmeņa samazināšanos asinīs. Ārsts var Jums regulāri nozīmēt asins analīzes, lai kontrolētu magnija līmeni.
- izsitumi, iespējams, ar sāpēm locītavās (subakūta ādas sarkanā vilkēde).

Neuztraucieties par šo iespējamo blakusparādību sarakstu. Jums var nebūt neviens no tām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Omeprazole Olainfarm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

PA/AI/PVH-AI blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

ABPE pudele

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt pudeli cieši aizvērtu, lai pasargātu no mitruma.

Pēc pudeles pirmās atvēršanas kapsulas jāizlieto 3 mēnešu laikā.

Pēc lietošanas cieši aizvērt vāciņu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Omeprazole Olainfarm satur:

- Aktīvā viela ir omeprazols.
Katra kapsula satur 20 mg omeprazola.
- Citas sastāvdaļas ir:
 - *kapsulas saturs*: cukura lodītes (satur kukurūzas cieti un saharozi), nātrijs laurilsulfāts, nātrijs hidrogēnfosfāts, mannijs (E 421), hipromeloze 6 cP, makrogols 6000, talks, polisorbāts 80, titāna dioksīds (E 171), metakrilskābes un etilakrilāta kopolimērs (1:1);
 - *kapsulas apvalks*: želatīns, krāsviela hinolīna dzeltenais (E 104) un titāna dioksīds (E 171).

Omeprazole Olainfarm ārējais izskats un iepakojums

Necaurspīdīgas, dzeltenas kapsulas, kas satur gandrīz baltas līdz krēmbaltas lodveida mikrogranulas (lodītes).

Iepakojumi

PA/Al/PVH-Al blisteris:

28, 30, 56, 60 kapsulas.

ABPE pudele:

28, 30, 56, 60 kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS Olainfarm

Rūpniecu iela 5, Olaine, LV-2114, Latvija

Tālr.: +371 67013705

E-pasts: olainfarm@olainfarm.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2024