

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam**Ibugard 60 mg supozitoriji***Ibuprofenum*

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, pirms Jūsu bērns vai Jūs sākat lietot šīs zāles, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā vai kā to ieteicis Jūsu bērna vai Jūsu ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu bērnam vai Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Jums jākonsultējas ar ārstu:
 - ja Jūsu 3-5 mēnešus vecais bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk pēc 24 stundām vai
 - ja Jūsu bērns, kas sasniedzis vismaz 6 mēnešu vecumu, nejūtas labāk vai jūtas sliktāk pēc 3 dienām.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Ibugard 60 mg supozitoriji un kādam nolūkam tos lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas
3. Kā lietot Ibugard 60 mg supozitorijus
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Ibugard 60 mg supozitorijus
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ibugard 60 mg supozitoriji un kādam nolūkam tos lieto

Ibugard 60 mg supozitoriju aktīvā viela ir ibuprofēns, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL). Šīm zālēm ir raksturīga sāpes atvieglojoša, ķermeņa temperatūru pazeminoša un pretiekaisuma iedarbība.

Šīs zāles ir izstrādātas, lai bērniem īslaicīgi un simptomātiski ārstētu vieglas vai vidēji stipras sāpes un drudzi.

Ibugard 60 mg supozitoriju lietošana ir ieteicama, kad nav iespējama zāļu iekšējīga lietošana. Ibugard 60 mg supozitoriji ir paredzēti bērniem no 3 mēnešu (ķermeņa masa no 6 kg) līdz 2 gadu (ķermeņa masa 12 kg) vecumam.

2. Kas Jums jāzina pirms Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas

Nelietojiet Ibugard 60 mg supozitorijus vai nelietojiet tos savam bērnam, ja:

- Jums ir alerģija pret ibuprofēnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu vai citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL);
- Jums pēc acetilsalicilskābes vai citu nesteroīdo pretiekaisuma zāļu lietošanas kādreiz ir bijuši alerģijas simptomi, piemēram, izdalījumi no deguna, nātrene, sejas, mēles, lūpu vai rīkles tūska, bronhu spazmas vai astma;
- Jums pēc ārstēšanas ar NPL ir bijusi kuņģa un/vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla ar perforāciju vai asiņošanu;
- Jums ir (bijušas divas vai vairākas epizodes) kuņģa čūla vai asiņošana;
- Jums ir smaga aknu mazspēja, smaga nieru mazspēja vai smaga sirds mazspēja;

- vienlaikus lietojat citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, arī COX-2 inhibitorus (var palielināties blakusparādību risks);
- Jums ir patoloģijas (piemēram, koagulācijas traucējumi vai trombocitopēnija), kas var vairost noslieci uz asiņošanu;
- Jums ir smadzeņu asinsvadu vai citāda veida aktīva asiņošana;
- ja Jums vemšanas, caurejas vai nepietiekamas šķidruma uzņemšanas dēļ organismā ir pārāk maz šķidruma;
- bērna ķermeņa masa nav lielāka par 6 kg vai mazāka (līdz 3 mēnešu vecumam).

Ibuprofēnu saturošas zāles nav atļauts lietot grūtniecības trešajā trimestrī (skatīt apakšpunktu “Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte”).

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Pirms Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietojot ibuprofēnu, ir ziņots par alerģiskas reakcijas pazīmēm pret šīm zālēm, tostarp elpošanas traucējumiem, sejas un kakla rajona pietūkumu (angioedēmu), sāpēm krūtīs. Nekavējoties pārtrauciet Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja pamanāt kādas no šīm pazīmēm.

Konsultējieties ar farmaceitu vai ārstu, ja Jums ir infekcija – lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Nevēlamās blakusparādības iespējams vājināt līdz minimumam, pēc iespējas īslaicīgi lietojot minimālo simptomu kontrolei nepieciešamo efektīvo devu.

Jākonsultējas ar ārstu, ja pirms Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas vai parakstīšanas Jums vai Jūsu bērnam iepriekš ir diagnosticēta:

- sarkanā vilkēde vai jaukta tipa saistaudu slimība;
- anorektāla slimība;
- kuņģa-zarnu trakta slimības vai hroniskas zarnu trakta slimības (čūlainais kolīts, Krona slimība);
- arteriāla hipertensija un/vai sirdsdarbības traucējumi;
- nieru darbības traucējumi;
- aknu darbības traucējumi;
- asiņu recēšanas traucējumi;
- aktīva vai agrāk bijusi bronhiālā astma vai alerģiskas reakcijas simptomi (pēc šo zāļu lietošanas ir iespējama bronhu sašaurināšanās);
- vējbakas – lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Ir iespējama dzīvībai bīstama kuņģa-zarnu trakta asiņošana, čūla vai perforācija, pirms kuras var būt un var nebūt brīdinājuma simptomi. Ja pacientam ir kuņģa-zarnu trakta asiņošana vai čūla, šo zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Pacientiem, kam anamnēzē ir kuņģa-zarnu trakta slimības, ārsts jāinformē par visiem netipiskajiem simptomiem (īpaši asiņošanu) gremošanas traktā, īpaši ārstēšanas sākumfāzē.

Vienlaicīga ilgstoša dažādu pretsāpju līdzekļu lietošana var izraisīt nieru bojājumu un radīt nieru mazspējas risku (pretsāpju līdzekļu lietošanas izraisīta nefropātija).

Pretiekaisuma/pretsāpju līdzekļu, piemēram, ibuprofēna, lietošana var būt saistīta ar nedaudz lielāku miokarda infarkta vai insulta risku, īpaši ja tiek lietotas lielas devas. Nepārsniedziet ieteikto devu vai ārstēšanās ilgumu.

Pirms Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

- sirdsdarbības traucējumi, arī sirds mazspēja, stenokardija (sāpes krūtīs), kā arī ja Jums ir bijis miokarda infarkts, izdarīta šuntēšanas operācija, bijusi perifēro artēriju slimība (artēriju sašaurināšanās vai aizsprostošanās izraisīta asinsrites pasliktināšanās kājās vai pēdās) vai jebkuras formas insults (arī mikroinsults vai pārejoša išēmijas lēkme jeb PIL).
- augsts asinsspiediens, diabēts, augsts holesterīna līmenis, sirds slimība vai insults ģimenes anamnēzē vai ja smēķējat.

Nopietnas ādas reakcijas

Saistībā ar ibuprofēna lietošanu ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, tostarp eksfoliatīvu dermatītu, daudzformu eritēmu, Stīvensa–Džonsona sindromu, toksisku epidermas nekrolīzi, zāļu izraisītu reakciju ar eozinofiliju un sistēmiskiem simptomiem (*drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms — DRESS*) un akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AGEP). Nekavējoties pārtrauciet lietot Ibugard 60 mg supozitorijus un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no 4.punktā aprakstītajiem simptomiem, kas saistīti ar šīm nopietnajām ādas reakcijām.

Ibuprofēna lietošana jāpārtrauc un nekavējoties jāsaazinās ar ārstu, ja Jums vai Jūsu bērnam rodas kāds no šiem angioedēmas simptomiem:

- sejas, mēles vai rīkles tūska;
- apgrūtināta rīšana;
- nātrene un apgrūtināta elpošana.

Pacientiem, kam ir sistēmiska sarkanā vilkēde un jaukta tipa saistaudu patoloģijas, var palielināties aseptiska meningīta risks.

Infekcijas

Ibugard 60 mg supozitoriju lietošana var slēpt infekcijas pazīmes, piemēram, drudzi un sāpes. Tāpēc iespējams, ka Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas dēļ var tikt kavēta infekcijas atbilstošas ārstēšanas sākšana, un tas var paaugstināt komplikāciju risku. Tas novērots baktēriju izraisītas pneimonijas (plaušu karsoņa) un ar vējbakām saistītu bakteriālu ādas infekciju gadījumā. Ja Jūs lietojat šīs zāles, kamēr Jums ir infekcija, un infekcijas simptomi nepāriet vai pastiprinās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ibugard 60 mg supozitoriju aktīvā viela ibuprofēns uz laiku var nomākt trombocītu funkciju (to agregāciju). Tādēļ pacientiem, kam ir asiņu koagulācijas traucējumi, nepieciešama stingra uzraudzība.

Ilgstošas Ibugard 60 mg supozitoriju lietošanas laikā regulāri jākontrolē aknu enzīmu līmenis, nieru darbība un asinsaina.

Bērniem ar atūdeņotu organismu ir nieru darbības traucējumu risks.

Galvassāpes, kas var rasties ilgstošas pretsāpju līdzekļu lietošanas laikā, nav atļauts ārstēt, palielinot šo zāļu devas.

Dažos ibuprofēna lietošanas gadījumos ziņots par toksisku ambliopiju (redzes asuma samazināšanos), tādēļ ārsts jāinformē par jebkuriem redzes traucējumiem.

Citas zāles un Ibugard 60 mg supozitoriji

Pastāstiet savam vai sava bērna ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Iespējama Ibugard 60 mg supozitoriju mijiedarbība ar citām zālēm. Šādas zāles ir, piemēram:

- pretsāpju līdzekļi, acetilsalicilskābe/aspirīns vai citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi;
- zāles augsta asinsspiediena pazemināšanai (AKE inhibitori, piemēram, kaptoprils, bēta blokatori, piemēram, atenolols, un angiotensīna II receptoru antagonisti, piemēram, losartāns);

- antikoagulanti (t. i., asinis šķidrinošie/prettrombu līdzekļi, piemēram, acetilsalicilskābe/aspirīns, varfarīns un tiklopidīns);
- litiju saturošas zāles vai selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (tiek lietoti pret depresiju);
- metotreksāts (lieto pret dažiem vēža veidiem);
- kortikosteroīdi (tiek lietoti pret iekaisīgiem stāvokļiem);
- ciklosporīni (zāles imūnsistēmas nomākšanai);
- sirds glikozīdi, piemēram, digoksīns (zāles pret sirdsdarbības traucējumiem);
- takrolims (zāles imūnsistēmas nomākšanai);
- mifepristons (lieto farmakoloģiskai grūtniecības pārtraukšanai);
- zidovudīns vai ritonavīrs (lieto pret HIV vai AIDS);
- hinolonu vai aminoglikozīdu grupas līdzekļi (antibiotikas infekciju ārstēšanai);
- vorikonazols vai flukonazols (lieto pret sēnīšu infekcijām);
- probenecīds vai sulfīnpirazons (zāles pret podagru);
- iekšķīgi lietojamie pret diabēta līdzekļi;
- holestiramīns (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai);
- fenitoīns (lieto pret epilepsiju);
- baklofēns (lieto pret skeleta muskuļu spazmām).

Iespējama Ibugard 60 mg supozitoriju mijiedarbība arī ar dažām citām zālēm, tādēļ pirms Ibugard 60 mg supozitoriju un citu zāļu vienlaicīgas lietošanas Jums vienmēr jākonsultējas ar savu ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Nelietojiet Ibugard 60 mg supozitoriju grūtniecības pēdējos 3 mēnešos, jo tas var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam vai radīt traucējumus dzemdībās.

Tas var izraisīt nieru un sirdsdarbības traucējumus Jūsu nedzimušajam bērnam. Tas var ietekmēt Jūsu un Jūsu bērna noslieci uz asiņošanu un aizkavēt vai pagarināt dzemdības.

Jūs nedrīkstat lietot Ibugard 60 mg supozitoriju pirmajos 6 grūtniecības mēnešos, ja vien tas nav absolūti nepieciešams un to nav ieteicis ārsts. Ja Jums ir nepieciešama ārstēšana šajā periodā vai laikā, kad plānojat grūtniecību, jālieto pēc iespējas mazāka deva pēc iespējas īsāku laika periodu. Ja Ibugard 60 mg supozitoriju lieto ilgāk par dažām dienām sākot no 20. grūtniecības nedēļas, tas var izraisīt nieru darbības traucējumus vēl nedzimušajam bērnam, kas, savukārt, izraisa zemu amnija šķidruma līmeni, kas ieskauj bērnu (oligohidramniju), vai asinsvadu sašaurināšanos (ductus arteriosus) bērna sirdī. Ja Jums nepieciešama ārstēšana ilgāka par dažām dienām, ārsts var ieteikt papildu uzraudzību.

Barošana ar krūti

Nedaudz ibuprofēna var izdalīties mātes pienā. Par gadījumiem, kad ar krūti barotiem zīdaiņiem būtu bijušas nevēlamas blakusparādības, nav zināms. Īslaicīgi lietojot sāpju un drudža ārstēšanai ieteicamās ibuprofēna devas, barošana ar krūti nav jāpārtrauc.

Fertilitāte

Šīs grupas zāles (nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi) var nevēlami ietekmēt sieviešu auglību. Ietekme ir pārejoša un izzūd, kad šo zāļu lietošana ir pārtraukta.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ibuprofēns Jums var izraisīt reiboni vai miegainību. Šādā gadījumā nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ar instrumentiem vai iekārtām. Nav atļautas arī nekādas citas darbības, kuru laikā nepieciešama modrība.

3. Kā lietot Ibugard 60 mg supozitorijus

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Rektālai lietošanai.

Nelietot 3 mēnešu vecumu nerasniegušiem bērniem.

Nelietot bērniem ar ķermeņa masu, kas mazāka par 6 kg.

Nepārsniet maksimālo dienas devu.

Jālieto mazākā iedarbīgā deva iespējami īsāku laiku, kas nodrošina simptomu atvieglošanu. Ja Jums ir infekcija, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja tās simptomi (piemēram, drudzis un sāpes) nepāriet vai pastiprinās (skatīt 2. punktu).

Ibuprofēna maksimālā dienas deva ir 20–30 mg/kg ķermeņa masas, un tā jāsadala 3–4 atsevišķās devās. Reizes deva nedrīkst būt lielāka par 10 mg/kg ķermeņa masas.

Parastās devas

Vecums (ķermeņa masa)	Reizes deva	Dienas deva
3–9 mēneši (6–8 kg)	Viens 60 mg supozitorijs	3 reizes dienā ik pēc 6–8 stundām. Nelietojiet vairāk nekā 3 supozitorijus dienā.
9 mēneši līdz 2 gadi (8–12 kg)	Viens 60 mg supozitorijs	4 reizes dienā ik pēc 6 stundām. Nelietojiet vairāk nekā 4 supozitorijus dienā.

Ja šīs zāles lietojot 3–5 mēnešus veciem bērniem, simptomi pastiprinās vai neizzūd 24 stundu laikā, jākonsultējas ar ārstu.

Ja šīs zāles 6 mēnešus sasniegušiem bērniem jālieto ilgāk nekā 3 dienas vai ja simptomi pastiprinās, jākonsultējas ar ārstu.

Šīs zāles ir paredzētas īslaicīgai lietošanai.

Ibugard 60 mg supozitoriju lietošana pacientiem ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir viegla vai vidēji smaga nieru un/vai aknu mazspēja, jālieto pēc iespējas mazākas devas.

Personām ar smagu nieru vai aknu mazspēju ibuprofēna lietošana nav ieteicama.

Ja esat lietojis Ibugard 60 mg supozitorijus vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Ibugard 60 mg supozitorijus vairāk nekā noteikts vai ja šīs zāles Jūsu bērns ir lietojis nejauši, vienmēr jāsazinās ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai uzzinātu iespējamo risku vai ieteikumus par tālāko rīcību.

Pārdozēšanas gadījumi ir reti.

Vairumam pacientu var būt:

- slikta dūša, vemšana, sāpes vēdera augšdaļā vai caureja;
- troksnis ausīs, galvassāpes un kuņģa vai zarnu asiņošana.

Smaga saindēšanās ietekmē centrālo nervu sistēmu, un tās izpausmes ir:

- miegainība;
- trauksme, orientēšanās traucējumi vai koma (ļoti reti);
- krampji (ļoti reti).

Smagas saindēšanās laikā iespējama:

- metaboliska acidoze ar tādiem simptomiem kā slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana (iespējams, ar asiņu piejaukumu), galvassāpes, troksnis ausīs, apjukums un saraustītas acu kustības. Pēc lielu

devu lietošanas ziņots par miegainību, sāpēm krūšu kurvī, sirdsklauvēm, samaņas zudumu, krampjiem (galvenokārt bērniem), vājumu un reiboņiem, asinīm urīnā, aukstuma sajūtu un elpošanas traucējumiem;

- protrombīna laika/INR palielināšanās;
- akūta nieru mazspēja vai aknu bojājumi;
- astmas simptomu paasināšanās bronhiālās astmas slimniekiem.

Specifisks antidots nav zināms. Ārstēšanai jābūt simptomātiskai un atbalstošai.

Ja esat aizmirsis lietot Ibugard 60 mg supozitorijus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet lietot ibuprofēnu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no tālāk minētajiem simptomiem.

- Sarkanīgi, nepacelti, mērķim līdzīgi vai aplveida plankumi uz ķermeņa, bieži ar pūslīšiem centrā, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, dzimumorgānos un acīs. Pirms šādu nopietnu ādas izsitumu parādīšanās, var būt drudzis un gripai līdzīgi simptomi (eksfoliatīvs dermatīts, daudzformu eritēma, Stīvensa–Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze).
- Plaši izsitumi, augsta ķermeņa temperatūra un palielināti limfmezgli (DRESS sindroms).
- Plaši sarkani, zvīņaini izsitumi ar pacēlumu zem ādas un pūslīšiem, ko pavada drudzis. Simptomi parasti parādās ārstēšanas sākumā (akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze).

Ibugard 60 mg supozitoriji parasti ir labi panesami. Īslaicīgi lietojot bez receptes pieejamās ibuprofēna devas, novērotas turpmāk minētās blakusparādības.

Retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

- dedzināšana aiz krūškaula, sāpes vēderā, slikta dūša, flatulence, lokāls anālās atveres kairinājums;
- centrālās nervu sistēmas traucējumi, piemēram, galvassāpes, reibonis, bezmiegs, miegainība, trauksme, aizkaitināmība un noguruma sajūta;
- paaugstinātas jutības reakcijas, kas izpaužas kā ādas izsitumi
- un nieze;
- dažādas ādas izsitumu formas;
- redzes traucējumi.

Reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem):

- caureja, vēdera pūšanās, aizcietējums, vemšana;
- zvanīšana (troksnis) ausīs, griešanās sajūta.

Ļoti reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēku):

- pacientiem ar autoimūnām slimībām (sistēmisku sarkano vilkēdi vai jaukta tipa saistaudu slimībām) pēc ibuprofēna lietošanas atsevišķos gadījumos novērots aseptisks meningīts ar kakla stīvumu, galvassāpēm, sliktu dūšu, vemšanu, drudzi un orientācijas traucējumiem;
- novērotas asinsainas novirzes (anēmija, leukopēnija jeb leukocītu skaita samazināšanās, trombocitopēnija jeb trombocītu skaita samazināšanās un pancitopēnija - asiņu patoloģija, kam raksturīgs normālu asiņu formelementu – eritrocītu, leukocītu un trombocītu - deficīts, un agranulocitoze jeb granulocītu skaita samazināšanās). Pirmie simptomi ir drudzis, rīkles iekaisums, virspusējas mutes dobuma gļotādas čūlas, gripai līdzīgi simptomi, nespēks un asiņošana (piemēram, zilumu rašanās, ekhimozes, purpura un deguna asiņošana);

- smagas paaugstinātas jutības reakcijas, kas izpaužas ar sejas, balsenes un mēles tūsku, elpas trūkumu, tahikardiju jeb sirds ritma traucējumiem un hipotensiju jeb asinsspiediena pazemināšanos un šoku;
- astma vai tās paasinājums, bronhu spazmas, aizdusa, sēkšana;
- ar lielu NPL devu lietošanu saistīta tūska, sirdsklauves, hipertensija un sirds mazspēja, vaskulīts;
- kuņģa un/vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla kopā ar asiņošanu vai bez tās (dažkārt asiņošana var izraisīt nāvi), īpaši gados vecākiem pacientiem, kā arī perforācija, čūlains mutes dobuma gļotādas iekaisums, gastrīts, mutes dobuma gļotādas čūlas;
- kolīta un Krona slimības paasinājums;
- aknu darbības traucējumi, aknu bojājums un akūts aknu iekaisums (īpaši pēc ilgstošas ibuprofēna lietošanas), aknu mazspēja, dzelte;
- nopietnas ādas infekcijas vējbaku laikā. Tiklīdz rodas pirmās ādas reakciju pazīmes, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un dodieties pie ārsta;
- nieru darbības traucējumi, kas izpaužas kā parasti izvadītā urīna daudzuma samazināšanās, duļķains urīns, asinis urīnā, muguras sāpes un tūska (īpaši kāju tūska). Palielināta urīnvielas koncentrācija asinīs, nieru mazspēja, nefrotiskais sindroms un intersticiāls nefrīts, iespējams, kopā ar akūtu nieru mazspēju. Ja ieraduma dēļ tiek lietoti vairāki pretsāpju līdzekļi, retos gadījumos iespējami ilgstoši nieru darbības traucējumi;
- pazemināts hematokrīta un hemoglobīna līmenis, uz ko norāda laboratorisko izmeklējumu rezultāti;
- psihotiskas reakcijas un depresija.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- āda kļūst jutīga pret gaismu;
- sāpes krūtīs, kas var liecināt par potenciāli nopietnu alerģisku reakciju, ko sauc par *Kounis* sindromu.

Tādu zāļu kā Ibugard 60 mg supozitoriju lietošana var būt saistīta ar nelielu sirdslēkmes jeb miokarda infarkta vai insulta riska palielināšanos.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ibugard 60 mg supozitorijus

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ibugard 60 mg supozitoriji satur

Aktīvā viela ir ibuprofēns. Katrs supozitorijs satur 60 mg ibuprofēna.

Palīgviela ir cietie tauki.

Ibugard 60 mg supozitoriju ārējais izskats un iepakojums

Ibugard 60 mg supozitoriji ir balti vai gandrīz balti torpēdas formas supozitoriji ar līdzenu virsmu un bez bojājumiem.

Supozitoriji ir iepakoti PVH/PE blisteros. Kārbiņā ir 5 vai 10 supozitoriji.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Polija

Ražotājs

FARMINA Sp. z.o.o.

Zakład w Myślenicach

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem

Bulgārija Панактив Бейби

Latvija Ibugard 60 mg supozitoriji

Lietuva Ibugard 60 mg žvakutės

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

02/2024