

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Decatylen 0,25 mg/0,03 mg sūkājamās tabletes**
dequalinii chloridum/cinchocaini hydrochloridum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Decatylen un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Decatylen lietošanas
3. Kā lietot Decatylen
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Decatylen
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Decatylen un kādam nolūkam to lieto

Decatylen sūkājamās tabletes iznīcina baktērijas un sēnītes, kas rada iekaisumu rīklē un mutes dobumā. Sūkājamās tabletes satur aktīvo vielu, kas remdina sāpes.

Decatylen sūkājamās tabletes parasti ir labi panesamas, tās nekairina mutes gļotādu. Decatylen neizsauc zobu kariesu, to var lietot arī diabēta slimnieki.

Decatylen lieto akūtu mutes dobuma un rīkles infekciju ar izteiktu sāpju sindromu lokālai ārstēšanai, piemēram:

- mandeļu, balsenes, rīkles gļotādas iekaisums (tonsilīts, laringīts, faringīts);
- smaganu iekaisums (gingivīts);
- mutes dobuma gļotādas iekaisums (stomatīts);
- mutes dobuma gļotādas sēnīšu infekcijas (piemēram, piena sēnīte);
- pēc mandeļu operācijas un zobu izraušanas, lai veicinātu sadzīšanu.

Decatylen rekomendē arī, ja ir nepatīkama elpa.

2. Kas Jums jāzina pirms Decatylen lietošanas**Nelietojiet Decatylen šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām dequalīnija hlorīdu un cinhokaīna hidrochlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- alerģija pret īpašām vielām - ceturtējā amonija sastāvdaļām (piemēram, benzalkonija hlorīdu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja ievēro lietošanas noteikumus, īpaša piesardzība nav nepieciešama.

Pirms Decatylen lietošanas informējiet ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir kādas citas slimības vai alerģija.

Pirms Decatylen lietošanas konsultējieties ar ārstu:

- ja Jums ir augsta ķermeņa temperatūra;

- ja vienas nedēļas laikā slimības simptomi nemazinās.

Citas zāles un Decatylen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Zobu pasta: Decatylen efektivitāti samazina anjoni, kas ir zobu pastas sastāvdaļa. Ievērojiet vismaz 30 minūšu starplaiku starp Decatylen sūkājamo tablešu lietošanu un zobu tīrīšanu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav zināms par kaitīgu ietekmi, lietojot Decatylen grūtniecības laikā vai, barojot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lai arī nav veikti pētījumi, maz ticams, ka Decatylen ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Decatylen satur sorbītu

Šīs zāles satur 1066,15 mg sorbīta (E420) katrā sūkājamā tabletē.

Sorbīts ir fruktozes avots. Ja ārsts ir teicis, ka Jums (vai Jūsu bērnam) ir kāda cukura nepanesība, vai Jums ir diagnosticēta reta ģenētiska slimība – iedzimta fruktozes nepanesība, kuras gadījumā organismā nesadalās fruktoze, pirms lietojat vai saņemat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Sūkājamās tabletes drīkst lietot arī diabēta slimnieki.

Sorbīts var izraisīt nepatīkamas sajūtas kuņģa-zarnu traktā un vieglu caureju veicinošu iedarbību.

3. Kā lietot Decatylen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma

Ik pēc 2 stundām 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās 1 sūkājamo tableti ik pēc 4 stundām.

Bērniem no 4 gadu vecuma

Ik pēc 3 stundām 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās 1 sūkājamo tableti ik pēc 4 stundām.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar ārstu.

Ja Jums liekas, ka medikamenta iedarbība ir par vāju vai par stipru, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Decatylen vairāk nekā noteikts

Kopumā Decatylen panesība ir ļoti laba; tomēr pārdozēšanas gadījumos var rasties caureja un vemšana, vai, ekstrēmos gadījumos, barības vada čūlas un nekroze. Ja esat lietojis Decatylen vairāk nekā noteikts, sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Decatylen

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā izsitumi un nieze, novērotas retos gadījumos. Retos vai ļoti retos gadījumos (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) iespējams elpas trūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Decatilen

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Decatilen satur

- Aktīvās vielas ir dekvalīnija hlorīds un cinhokaīna hidrohlorīds.
Katra sūkājamā tablete satur 0,25 mg dekvalīnija hlorīda un 0,03 mg cinhokaīna hidrohlorīda.
- Citas sastāvdaļas ir sorbīts (E420), talks, magnija stearāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, piparmētru eļļa un piparmētru aromatizētājs.

Decatilen ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apaļas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un iespaidumu „D” otrā pusē.

Tabletes iepakotas PVH/Aclar/PVH-alumīnija blisteros.

Iepakojumā 20, 30 vai 40 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Balkanpharma-Razgrad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad 7200, Bulgārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2024