

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums izsmidzināšanai hexetidinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiat farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 10 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

1. Kas ir Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas jāzina pirms Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma lietošanas
3. Kā lieto Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums un kādam nolūkam tās lieto

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu lieto izsmidzināšanai mutes dobumā un rīklē, ja ir nepieciešama antibakteriāla vai pretsēnīšu iedarbība:

- mutes dobuma infekcijas: smaganu iekaisums, mutes gļotādas iekaisums, zoba saknes un apkārtējo audu iekaisums un pioreja (parodontoze),
- sāpošas aftas un citas mutes dobuma un rīkles sēnīšu slimības,
- rīkles infekcijas, mandeļu iekaisums, angīna, rīkles gļotādas iekaisums,
- dezinfekcijai mutes un zobu ķirurģijā,
- ikdienas mutes higiēnai, izelpas dezodorācijai.

2. Kas jāzina pirms Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma lietošanas

Nelietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma sastāvdaļu;
- bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- Nelietojiet ilgāk par 10 dienām bez ārsta ieteikuma.
- Hexoral Spray 2 mg/ml paredzēts lietošanai mutes dobumā; nenorīt šķīdumu.
- Neieelpojiet, izsmidzinot Hexoral spray 2 mg/ml šķīdumu. Izsmidzinātais šķīdums var nonākt elpošanas ceļos un izraisīt laringospazmu.

- Ja simptomi nemainās vai stāvoklis kļūst sliktāks, pārtrauciet zāļu lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Nelietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Citas zāles un Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav adekvātu un labi kontrolētu pētījumu par heksetidīna lietošanu grūtniecības laikā un barošanas ar krūti periodā. Nav zināms vai heksetidīns vai tā metabolīti nonāk mātes pienā. Necīgs heksetidīna daudzums uzsūcas sistēmiski; ir maz ticams, ka lietojot heksetidīnu grūtniecības laikā vai barošanas ar krūti periodā, tas var radīt risku auglim vai zīdainim.

Taču grūtniecības laikā vai barošanas ar krūti periodā heksetidīnu nevar lietot, ja vien potenciālais ieguvums no ārstēšanas mātei nav lielāks par iespējamo risku auglim vai zīdainim.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim nav datu par ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums satur etilspirtu un nātriju

Šīs zāles satur 41,6 mg alkohola (etilspirta) katrā izsmidzinājumā (1 ml), kas ir līdzvērtīgi 41,6 mg/ml (4,16 % w/v). Šo zāļu daudzums izsmidzinājumā ir līdzvērtīgi mazāk kā 2 ml alus vai 1 ml vīna. Nelielais alkohola daudzums zālēs neizraisa ievērojamu ietekmi. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Viena Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma reizes deva ir 1 līdz 2 izsmidzinājumi, katru 1-2 sekundes izsmidzinot mutes dobumā.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu lieto 2 reizes dienā, vislabāk no rīta un vakarā pēc ēšanas, vai līdz 3 reizēm dienā atkarībā no slimības smaguma un ārsta vai stomatologa ieteikuma.

Heksetidīns piesaistās gļotādai, radot ilgstošu efektu, tādēļ tas lietojams pēc ēšanas.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums domāts izsmidzināšanai mutes dobumā un rīklē, tādējādi lokāli ārstējot iekaisumu specifiskā, ātrā un ērtā veidā.

Lietošanas veids

Jāievēro sekojoši norādījumi

Ar nelielu spēku pagrieziet izsmidzinātāju pret atbilstošo pudelītes vāciņa atveri. Neturiet izsmidzinātāju pagrieztu pret sevi.

Ievietojiet izsmidzinātāju mutē, kā norādīts zīmējumā uz zāļu kastītes, izsmidziniet zāles tieši uz bojātajām vietām. Izsmidzinot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu, baloniņu turiet vertikāli, neapagrieztā stāvoklī. Neieelpojiet, izsmidzinot šķīdumu, jo tas var izraisīt laringospazmu (skatīt 2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Lai izsmidzinātu vienu Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma izsmidzinājumu, turiet baloniņa vāciņu nospiežot 1-2 sekundes, aizturiet elpu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiel ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

hipersensitivitāte,

garšas sajūtas zudums (ageizija), garšas sajūtas izmaiņas (dizgeizija),

klepus, elpas trūkums, laringospazma,

sausā mute, disfāģija (rīšanas traucējumi), slikta dūša, siekalu dziedzeru palielināšanās, vemšana,

angioedēma (tūska),

reakcijas ievadīšanas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt 6 mēnešus.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiel farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hexoral spray 2 mg/ml šķīdums satur

- Aktīvā(s) viela(s) ir heksetidīns (*Hexetidinum*). 1 ml šķīduma satur 2 mg heksetidīna.
- Citas sastāvdaļas ir polisorbāts 80, citronskābes monohidrāts, saharīnnātrijs, levomentols, eikaliptu eļļa, nātrijs kalcija edetāts, etilspirts (96%), nātrijs hidroksīds, attīrīts ūdens, slāpekļis.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums ārējais izskats un iepakojums

40 ml alumīnija baloniņš, plastikas smidzinātājs; ārējais iepakojums – kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Office 5, 6 & 7, Block 5

High Street

Tallaght

Dublin 24

D24 YK8N

Īrija

Ražotājs

Delpharm Orleans
5, avenue de Concyr
45071 ORLEANS Cedex 2, Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2023