

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Gasec Gastrocaps 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas****Gasec Gastrocaps 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas***omeprazolum***Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

- Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Gasec Gastrocaps un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Gasec Gastrocaps lietošanas
3. Kā lietot Gasec Gastrocaps
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Gasec Gastrocaps
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Gasec Gastrocaps un kādam nolūkam to lieto

Gasec Gastrocaps kapsulas satur aktīvo vielu omeprazolu. Tā pieder zāļu grupai, ko sauc par protonu sūkņa inhibitoriem. Šī zāļu grupa samazina kuņģa izdalītās skābes daudzumu.

Gasec Gastrocaps lieto šādu traucējumu ārstēšanai:

Pieaugušajiem

- gastroezofageālā atvēršanas slimība (GEAS). Tas ir stāvoklis, kad skābe no kuņģa nonāk barības vadā (cauruļveida orgāns, kas savieno rīkli ar kuņģi), izraisot sāpes, iekaisumu un dedzināšanu;
- čūlas zarnas sākuma daļā (divpadsmitpirkstu zarnas čūla) vai kuņģī (kuņģa čūla);
- čūlas, kas ir inficētas ar baktērijām, ko sauc par *Helicobacter pylori*. Ja Jums ir šī slimība, ārsts var izrakstīt arī antibiotiskos līdzekļus infekcijas ārstēšanai un čūlas dziedēšanai;
- čūlas, ko izraisījuši t.s. NPL (nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi). Gasec Gastrocaps var lietot arī, lai nepieļautu čūlu veidošanos NPL lietošanas gadījumā;
- pārāk daudz skābes kuņģī, ko izraisa audzējs aizkuņģa dziedzerī (Zolindžera – Elisona sindroms).

Bērniem

Bērni, kuri vecāki par 1 gadu un kuru ķermeņa masa ≥ 10 kg

- Gastroezofageālā atvēršanas slimība (GEAS). Tas ir stāvoklis, kad skābe no kuņģa nonāk barības vadā (cauruļveida orgāns, kas savieno rīkli ar kuņģi), izraisot sāpes, iekaisumu un dedzināšanu. Bērniem slimības simptomi var izpausties kā kuņģa satura atgriešanās mutē (regurgitācija), vemšana un slikta pieņemšanās svarā.

Bērni un pusaudži, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 30 kg

- čūlas, kas ir inficētas ar baktērijām, ko sauc par *Helicobacter pylori*. Ja Jūsu bērnam ir šī slimība, ārsts var parakstīt arī antibiotiskos līdzekļus infekcijas ārstēšanai un čūlas dziedēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Gasec Gastrocaps lietošanas**Nelietojiet Gasec Gastrocaps šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir alerģija pret zālēm, kas satur citus protonu sūkņa inhibitorus (piemēram, pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu, esomeprazolu);
- ja Jūs lietojiet nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Ja neesat pārliecināts, pirms Gasec Gastrocaps lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Gasec Gastrocaps var maskēt citu slimību simptomus. Tāpēc, ja Jūs novērojat kādu no tālāk minētajiem simptomiem pirms Gasec Gastrocaps lietošanas uzsākšanas vai tā lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu ja:

- bez iemesla zaudējat daudz svāra un Jums ir rīšanas traucējumi;
- ir sāpes vēderā vai gremošanas traucējumi;
- atvemjat uzturu vai asinis;
- ir melni izkārnījumi (asins iekrāsoti izkārnījumi);
- ir smaga vai nepārejoša caureja, jo omeprazols var nedaudz veicināt infekciozās caurejas rašanos;
- ir smagi aknu darbības traucējumi;
- Jums kādreiz ir bijusi ādas reakcija pēc ārstēšanās ar Gasec Gastrocaps līdzīgām zālēm;
- ja Jums ir jāveic specifiska asinsanalīze (hromogranīna A noteikšana).

Ja Jums uz ādas rodas izsitumi, īpaši vietās, kas ir pakļautas saules gaismas iedarbībai, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu, jo ārstēšana ar Gasec Gastrocaps var būt jāpārtrauc. Atcerieties pieminēt citas nevēlamas blakusparādības, piemēram, sāpes locītavās.

Lietojot protonu sūkņa inhibitorus, piemēram, Gasec Gastrocaps, it īpaši ilgāk par vienu gadu un, ja esat gados vecāks cilvēks, var nedaudz palielināties gūžas, plaukstu pamatnes vai mugurkaula lūzuma risks. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir osteoporoze vai arī Jūs lietojat kortikosteroīdus (kas var palielināt osteoporozes attīstības risku).

Lietojot protonu sūkņa inhibitorus, piemēram, omeprazolu 3 mēnešus vai ilgāk, iespējama magnija līmeņa samazināšanās asinīs. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, ja Jums rodas tādas magnija līmeņa samazināšanās (hipomagnēmija) pazīmes kā vājums, krampji, delīrijs, konvulsijas, reiboņa sajūta un sirds ritma traucējumi (neregulāra sirds darbība). Īpaši pastāstiet ārstam, ja vienlaikus ar Gasec Gastrocaps lietojat arī citas zāles, kuras var izraisīt magnija līmeņa samazināšanos asinīs, piemēram, digoksīnu vai diurētiskus līdzekļus. Ārsts var izlemt kontrolēt magnija līmeni Jūsu asins serumā.

Ja Jūs lietojat Gasec Gastrocaps ilgāku laiku (ilgāk par vienu gadu), iespējams, ārsts veiks regulāru Jūsu veselības kontroli. Jums jāziņo un jākonsultējas ar ārstu par jebkuru jaunu vai neparastu simptomu parādīšanos.

Lietojot omeprazolu, var rasties nieru iekaisums. Iespējamās pazīmes un simptomi var būt samazināts urīna tilpums vai asinis urīnā, un/vai paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, drudzis, izsitumi un locītavu stīvums. Par šādām pazīmēm jāziņo ārstējošajam ārstam.

Izmaiņas laboratorijas izmeklējumos

Palielināts hromogranīna A (CgA) līmenis var ietekmēt smadzeņu un nervu sistēmas (neiroendokrīno) audzēju izmeklējumu rezultātus. Lai izvairītos no šādiem traucējumiem, 5 dienas pirms CgA līmeņa noteikšanas terapija ar omeprazolu uz laiku jāpārtrauc.

Citas zāles un Gasec Gastrocaps

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Gasec Gastrocaps var ietekmēt citu zāļu iedarbību, savukārt dažas zāles var ietekmēt Gasec Gastrocaps iedarbību.

Nelietojiet Gasec Gastrocaps, ja Jūs lietojat **nelfinavīru** saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

- ketokonazolu, itraconazolu, posakonazolu vai vorikonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai);
- erlotinibu (lieto dažu audzēju ārstēšanai);
- digoksinu (lieto sirds slimību ārstēšanai);
- diazepāmu (lieto, lai ārstētu trauksmi, atslābinātu muskulatūru vai ārstētu epilepsiju);
- fenitoīnu (lieto epilepsijas ārstēšanai). Ja Jūs lietojat fenitoīnu, tad, uzsākot vai pārtraucot lietot Gasec Gastrocaps, ārstam Jūs pastiprināti jānovēro;
- zāles, ko izmanto asins sašķidrināšanai, tādas kā varfarīns vai K vitamīna blokatori. Uzsākot vai pārtraucot lietot Gasec Gastrocaps, ārstam Jūs pastiprināti jānovēro;
- rifampicīnu (lieto tuberkulozes ārstēšanai);
- atazanavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);
- takrolimu (lieto orgānu transplantācijas gadījumā);
- metotreksātu (lieto vēža un imūnsistēmas saslimšanu gadījumos);
- divšķautņu asinszāli (*Hypericum perforatum*) (lieto vieglas depresijas gadījumā);
- cilostazolu (lieto intermitējošas mijklibošanas gadījumā);
- sahinavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);
- klopidoģrelu (lieto, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos).

Ja ārsts Jums ir parakstījis tādus antibiotiskos līdzekļus kā amoksicilīnu un klaritromicīnu, kā arī Gasec Gastrocaps, lai ārstētu *Helicobacter pylori* infekcijas izraisītas čūlas, ir ļoti svarīgi, lai Jūs izstāstītu ārstam par visām citām zālēm, ko lietojat.

Gasec Gastrocaps kopā ar uzturu

Jūs varat lietot kapsulas gan kopā ar uzturu, gan tukšā dūšā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izlems, vai šajā laikā drīkst lietot Gasec Gastrocaps.

Ārsts izlems, vai Jūs drīkst lietot Gasec Gastrocaps, ja barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Gasec Gastrocaps ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Var parādīties tādas blakusparādības kā reibonis, redzes traucējumi (skatīt 4. punktu). Ja tas notiek, Jūs nedrīkst vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Gasec Gastrocaps satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Gasec Gastrocaps satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā kapsulā, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Gasec Gastrocaps

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts izstāstīs, cik daudz un cik ilgi kapsulas jālieto. Tas atkarīgs no Jūsu pašreizējā stāvokļa un vecuma.

Ieteicamās devas**Pieaugušajiem**

Lai **ārstētu** tādus GEAS simptomus kā **dedzināšanu un skābes atraugas**:

- ja ārsts konstatējis, ka barības vads ir nedaudz bojāts, parasti deva ir 20 mg vienu reizi dienā 4-8 nedēļas. Ārsts var ieteikt Jums lietot 40 mg lielu devu turpmākās 8 nedēļas, ja barības vads vēl nebūs sadzījis.

Lai **ārstētu čūlas zarnas** sākumdaļā (divpadsmitpirkstu zarnas čūla):

- parasti deva ir 20 mg vienu reizi dienā 2 nedēļas. Ārsts var ieteikt Jums lietot tādu pašu devu vēl 2 nedēļas, ja čūla nebūs sadzījusī;
- ja čūla vēl pilnībā nebūs sadzījusī, devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā 4 nedēļas.

Lai **ārstētu čūlas kuņģī** (kuņģa čūla):

- parasti deva ir 20 mg vienu reizi dienā 4 nedēļas. Ārsts var ieteikt Jums lietot tādu pašu devu vēl 4 nedēļas, ja čūla nebūs sadzījusī;
- ja čūla vēl pilnībā nebūs sadzījusī, devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā 8 nedēļas.

Lai **novērstu divpadsmitpirkstu zarnas čūlas un kuņģa čūlas** atkārtošanos:

- parasti deva ir 10 mg vai 20 mg vienu reizi dienā. Ārsts var palielināt devu līdz 40 mg vienu reizi dienā.

Lai **ārstētu NPL** (nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu) izraisītu **divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlas**:

- parasti deva ir 20 mg vienu reizi dienā 4 – 8 nedēļas.

Lai **novērstu divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlu veidošanos**, ja lietojat **NPL**:

- parasti deva ir 20 mg vienu reizi dienā.

Lai **ārstētu *Helicobacter pylori*** infekcijas izraisītas **čūlas** un nepieļautu to atkārtošanos:

- parasti deva ir pa 20 mg divas reizes dienā vienu nedēļu;
- ārsts var likt lietot antibiotiskos līdzekļus – amoksicilīnu, klaritromicīnu vai metronidazolu.

Lai **ārstētu pārmērīgu skābes daudzumu kuņģī**, ko izraisījis aizkuņģa dziedzera audzējs (Zolindžera – Elisona sindroms):

- parasti deva ir 60 mg dienā;
- ārsts pielāgos Jums devu atkarībā no Jūsu vajadzībām un arī izlems, cik ilgi Jums šīs zāles jālieto.

Lietošana bērniem

Lai **ārstētu** tādus GEAS simptomus kā **dedzināšanu un skābes atraugas**:

- bērni, kuri vecāki par 1 gadu un, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 10 kg, var lietot Gasec Gastrocaps. Deva bērniem ir atkarīga no viņu ķermeņa masas. Ārsts noteiks nepieciešamo omeprazola devu.

Lai **ārstētu *Helicobacter pylori*** infekcijas izraisītas **čūlas** un nepieļautu to atkārtošanos:

- bērni, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 30 kg, var lietot Gasec Gastrocaps. Deva bērniem ir atkarīga no viņu ķermeņa masas. Ārsts noteiks nepieciešamo omeprazola devu;
- ārsts var likt Jūsu bērnam lietot antibiotiskos līdzekļus – amoksicilīnu un klaritromicīnu.

Lietošana

- Ieteicams kapsulas lietot no rīta.
- Jūs varat lietot kapsulas kopā ar ēdienu vai tukšā dūšā.
- Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot pusglāzi ūdens. Nekošļājiet un nesasmalciniet kapsulas. Tas ir tāpēc, ka kapsulas satur apvalkotas peletes (sīkas lodītes), kas kuņģa skābajā vidē pasargā zāles no sadalīšanās. Svarīgi, lai peletes netiktu bojātas.

Kā rīkoties, ja Jums vai Jūsu bērnam ir grūtības norīt kapsulas

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir grūtības norīt kapsulas:

- atveriet kapsulu un norijiet tās saturu, uzdzerot pusglāzi ūdens. Vai iemaisiet kapsulas saturu glāzē ar negāzētu ūdeni vai skābu augļu sulu (piemēram, ābolu, apelsīnu vai ananāsu), vai ābolu biezeni;
- vienmēr samaisiet maisījumu pirms dzeršanas (maisījums nebūs caurspīdīgs). Izdzeriet maisījumu nekavējoties vai 30 minūšu laikā;
- lai pārlicinātos, vai esat izdzēris visas zāles, labi izskalojiet glāzi ar pusglāzi ūdens un to izdzeriet. Cietajās daļiņās ir zāles – nekošļājiet un nesasmalciniet tās.

Kapsulas apvalkam var ļaut arī izšķīst mutē un kapsulā esošās cietās daļiņas norīt, uzdzerot pusglāzi ūdens. Zarnās šķīstošās citās daļiņas nedrīkst sakošļāt.

Ja esat lietojis Gasec Gastrocaps vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Gasec Gastrocaps vairāk, nekā ārsts Jums izrakstījis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Gasec Gastrocaps

Ja esat aizmirsis lietot devu, izdariet to, līdzko atceraties. Taču, ja ir jau gandrīz nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat kādu no retām, bet nopietnām blakusparādībām, pārtrauciet lietot Gasec Gastrocaps un nekavējoties sazinieties ar ārstu:

- pēkšņa sēkšana, lūpu, mēles un rīkles vai ķermeņa pietūkums, izsitumi, ģibonis vai apgrūtināta rīšana (smaga alerģiska reakcija);
- ādas apsārtums ar pūšļiem vai lobīšanos. Iespējama arī izteikta pūšļu veidošanās uz lūpām, acīm, mutē, degunā un uz dzimumorgāniem un to asiņošana. Tas var būt Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze;
- dzeltena āda, tumšs urīns un nogurums, kas var būt aknu darbības traucējumu pazīmes.

Blakusparādību novērtēšanai tiek lietotas šādas biežuma kategorijas:

Ļoti bieži	Novēro vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem
Bieži	Novēro 1 līdz 10 no 100 cilvēkiem
Retāk	Novēro 1 līdz 10 no 1000 cilvēkiem
Reti	Novēro 1 līdz 10 no 10 000 cilvēkiem
Ļoti reti	Novēro mazāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem
Nav zināms	Biežumu nevar noteikt no pieejamiem datiem

Citas blakusparādības ir šādas:

Biežas blakusparādības

- galvassāpes;
- ietekme uz kuņģi vai zarnām – caureja, sāpes kuņģī, aizcietējums, vēdera uzpūšanās, labdabīgi polipi kuņģī;
- slikta dūša, vemšana.

Retākas blakusparādības

- pēdu un potīšu pietūkums;
- miega traucējumi (bezmiegs);
- reibonis, tirpšanas sajūta (durstīšanas sajūta), miegainība;

- griešanās sajūta (vertigo);
- izmaiņas asinsanalīžu rezultātos, kurās novērtē aknu darbību;
- izsitumi uz ādas, piepācēti izsitumi (nātrene) un niezoša āda;
- vispārēja slikta pašsajūta un enerģijas trūkums;
- gūžas kaula, plaukstu kaulu vai mugurkaula lūzums.

Retas blakusparādības

- izmaiņas asins sastāvā, piemēram, samazināts balto asins šūnu vai trombocītu skaits. Tas var izraisīt nespēku, zilumu veidošanos vai veicināt inficēšanos;
- alerģiskas reakcijas, dažkārt ļoti smagas, ieskaitot lūpu, mēles un rīkles pietūkumu, drudzis, sēkšana;
- zems nātrija līmenis asinīs. Tas var izraisīt nespēku, vemšanu un krampjus;
- uzbudinājuma, apjukuma vai nomākuma sajūta;
- garšas sajūtas izmaiņas;
- redzes traucējumi, piemēram, redzes miglošanās;
- pēkšņa apgrūtinātas elpošanas sajūta vai sēkšana (bronhospazmas);
- sausa mute;
- iekaisums mutē;
- infekcija, ko sauc par piena sēnīti, tā var skart zarnas. Infekciju izraisa sēnītes;
- mikroskopiski nosakāms resnās zarnas iekaisums (mikroskopisks kolīts);
- aknu darbības traucējumi, arī dzelte, kā rezultātā āda kļūst dzeltena; tumšs urīns un nogurums;
- matu izkrišana (alopēcija);
- izsitumi uz ādas pēc uzturēšanās saulē;
- locītavu sāpes (artralģija) vai muskuļu sāpes (mialģija);
- smagi nieru darbības traucējumi (intersticiālais nefrīts);
- pastiprināta svīšana.

Ļoti retas blakusparādības

- asins sastāva izmaiņas, tai skaitā agranulocitoze (balto asins šūnu trūkums);
- agresija;
- neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai jušana (halucinācijas);
- smagi aknu darbības traucējumi, kas izraisa aknu mazspēju un smadzeņu iekaisumu;
- pēkšņi stipri izsitumi, pūšļu veidošanās uz ādas vai tās lobīšanās. Tas var būt saistīts ar stipru drudzi un locītavu sāpēm (*Erythema multiforme*, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze);
- muskuļu vājums;
- krūšu palielināšanās vīriešiem.

Nav zināms (blakusparādības, kuru biežumu nav iespējams noteikt)

- hipomagnēmija, smaga hipomagnēmija var izraisīt arī hipokalciēmiju
- subakūta sistēmas sarkanā vilkēde, ādas forma (skatīt 2. punktu).

Gasec Gastrocaps ļoti retos gadījumos var ietekmēt baltās asins šūnas, izraisot imūndeficītu. Ja Jums ir infekcija ar tādiem simptomiem kā drudzis un **stipri** pasliktināts vispārējais veselības stāvoklis vai drudzis ar tādiem vietējas infekcijas simptomiem kā kakla, rīkles vai mutes sāpes vai apgrūtināta urinēšana, Jums pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar savu ārstu, lai ar asins analīžu palīdzību pārbaudītu, vai nav balto asins šūnu trūkums (agranulocitoze). Šajā gadījumā ir svarīgi, lai Jūs sniegtu ziņas par lietotajām zālēm.

Neuztraucieties par šo iespējamo blakusparādību sarakstu. Jums var nerasties neviena no tām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Zīņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Gasec Gastrocaps

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Pudele jāuzglabā cieši aizvērta, lai pasargātu zāles no mitruma.

Nelietot Gasec Gastrocaps pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicāji farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelieto. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gasec Gastrocaps satur

- Aktīvā viela ir omeprazols.
Gasec Gastrocaps 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Katra kapsula satur 20 mg omeprazola.
Gasec Gastrocaps 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Katra kapsula satur 40 mg omeprazola.
- Citas sastāvdaļas ir

<i>Gasec Gastrocaps 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</i>	<i>Gasec Gastrocaps 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</i>
<i>Zarnās šķīstošās peletes</i>	
Cukura lodītes (saharoze + kukurūzas ciete) Povidons K-30 Nātrija laurilsulfāts A tipa nātrija cietes glikolāts Nātrija fosfāts Hipromeloze Trietilcitrāts Metakrilskābes-etilakrilāta kopolimērs Nātrija hidroksīds Titāna dioksīds (E171) Talks	Cukura lodītes (saharoze + kukurūzas ciete) Povidons K-30 Nātrija laurilsulfāts A tipa nātrija cietes glikolāts Nātrija fosfāts Hipromeloze Trietilcitrāts Metakrilskābes-etilakrilāta kopolimērs Nātrija hidroksīds Titāna dioksīds (E171) Talks
<i>Kapsulas korpus</i>	
Želatīns Hinolīndzeltenais (E104) Eritrozīns (E127) Titāna dioksīds (E171)	Želatīns Hinolīndzeltenais (E104) Eritrozīns (E127) Titāna dioksīds (E171)
<i>Kapsulas vāciņš</i>	
Želatīns Eritrozīns (E127) Indigokarmīns (E132) Titāna dioksīds (E171)	Želatīns Eritrozīns (E127) Indigokarmīns (E132) Titāna dioksīds (E171)
<i>Uzdrukas tinte</i>	
Šellaka, etilspirts, izopropilspirts, propilēnglikols, butanols, polivinilpirolidons, nātrija hidroksīds, titāna dioksīds (E171).	

Gasec Gastrocaps ārējais izskats un iepakojums

Gasec Gastrocaps 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Cietās želatīna kapsulas ar uz kapsulas uzdrukātu „O” un „20”. Kapsulām ir oranžs korpuss un zils vāciņš. Katrā kapsulā ir baltas līdz bēšas krāsas zarnās šķīstošas peletes, kas satur 20 mg omeprazola.

Gasec Gastrocaps 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Cietās želatīna kapsulas ar uz kapsulas uzdrukātu „O” un „40”. Kapsulām ir oranžs korpuss un zils vāciņš. Katrā kapsulā ir baltas līdz bēšas krāsas zarnās šķīstošas peletes, kas satur 40 mg omeprazola.

Gasec Gastrocaps ir pieejams alumīnija/alumīnija blisteru iepakojumā vai augsta blīvuma polietilēna pudelēs (ABPE) ar polipropilēna vāciņu (vāciņā iestrādāts mitruma absorbents).

Gasec Gastrocaps 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Iepakojumā 7, 28 un 56 kapsulas.

Gasec Gastrocaps 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Iepakojumā 14 un 28 kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

TEVA PHARMA S.L.U, Polígono Industrial Malpica, calle C, número 4, 50016 Zaragoza, Spānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2023