

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Bisacodyl Viatris 5 mg apvalkotās tabletes**
*bisacodylum***Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts Jums teicis. Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Bisacodyl Viatris rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiat farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Bisacodyl Viatris un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Bisacodyl Viatris lietošanas
3. Kā lietot Bisacodyl Viatris
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Bisacodyl Viatris
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Bisacodyl Viatris un kādam nolūkam to lieto

Bisacodyl Viatris ir caurejas līdzeklis, kas tieši darbojas uz resno zarnu. Vēderu mīkstinošā darbība saistīta ar neabsorbētā ūdens un elektrolītu daudzuma palielināšanu resnajā zarnā. Zarnu trakta iztukšošana ir tik efektīva, ka dažos gadījumos zāles var aizvietot klizmu. Bisacodyl no gremošanas trakta uzsūcas minimālā daudzumā. Lietojot iekšķīgi, zarnu iztukšošanās parasti notiek apmēram pēc 6 stundām, lietojot zāles pirms gulētiešanas - pēc 8-12 stundām.

Bisacodyl Viatris lieto šādos gadījumos:

- dažādas izcelsmes aizcietējumi (pieraduma un hroniski aizcietējumi gulošiem pacientiem, pieraduma aizcietējumi gados veciem pacientiem, aizcietējumi pēc diētas maiņas, aizcietējumi pēcoperācijas periodā),
- iepriekšēja zarnu trakta sagatavošana tā galīgai attīrīšanai pirms ķirurģiskām operācijām.
- neatliekama zarnu trakta attīrīšana, piemēram, sagatavojot sievieti dzemdībām.

2. Kas Jums jāzina pirms Bisacodyl Viatris lietošanas**Nelietojiet Bisacodyl Viatris šādos gadījumos**

- ja Jums ir alerģija pret bisacodilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums ir akūta vēdera sindroms, zarnu trakta neaurejamība, apendicīts, gremošanas trakta iekaisīgi stāvokļi, asiņošana no gremošanas trakta,
- smaga dehidratācija (šķidruma zudums),

- nezināmas izcelsmes sāpes vēderā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bisacodyl Viatris lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jāizvairās no ilgstošas un sistemātiskas Bisacodyl Viatris lietošanas, jo pretējā gadījumā aizcietējums saasinās, un vēdera izeja nav iespējama bez arvien spēcīgāku caurejas līdzekļu lietošanas.

Nelietot zāles nezināmas izcelsmes vēdera sāpju ar sliktu dūšu un vemšanu gadījumā. Bisakodila vēderu mīkstināšā darbība var izraisīt kālija zudumu (hipokaliēmiju), tāpēc, vienlaicīgi lietojot urīndzenošus, β -adrenomimētiskus līdzekļus, kā arī zāles, kuru toksicitāte palielinās kālija nepietiekamības gadījumā (piemēram, sirds glikozīdus), jāievēro piesardzība.

Citas zāles un Bisacodyl Viatris

Zāles var pastiprināt ūdens un elektrolītu zudumu. Piens un antacīdie līdzekļi (neitralizē kuņģa skābi) pavājina bisakodila darbību. Bisacodyl Viatris nevajadzētu lietot stundu pēc piena produktu vai antacīdo līdzekļu lietošanas.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

Bisacodyl Viatris satur laktozi, saharozi, košinila sarkano (E124).

Šīs zāles satur laktozi un saharozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. Košinila sarkanais var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Rūpīgi jāapsver Bisacodyl Viatris lietošanas lietderība ilgāk par 7 dienām.

3. Kā lietot Bisacodyl Viatris

Bisacodyl Viatris tabletēm ir apvalks, kas aizsargā no kuņģi kairinošās darbības, tāpēc tabletes jānorij veselas, iepriekš nesakošļājot un nesasmalcinot.

Bisacodyl Viatris lieto iekšķīgi, individuāli, atkarībā no atbildes reakcijas.

Lietošana bērniem līdz 10 gadu vecumam ar hronisku aizcietējumu tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Bisacodyl Viatris nedrīkst lietot bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Īstermiņa ārstēšana aizcietējumu gadījumā

- Pieaugušajiem un bērniem no 10 gadu vecuma: 1-2 apvalkotās tabletes (5 – 10 mg) pirms gulētiešanas.
- Bērniem no 6 līdz 10 gadu vecuma: 1 apvalkotā tablete (5 mg) pirms gulētiešanas.

Sagatavošanās diagnostikām procedūrām un pirms ķirurģiskām operācijām

Lietot tikai ārsta uzraudzībā.

- Pieaugušajiem un bērniem no 10 gadu vecuma: 2 apvalkotās tabletes (10 mg) no rīta un

- vakarā un 1 supozitorijs ieteicams nākošajā rītā.
- Bērniem no 6 līdz 10 gadu vecuma: 1 apvalkotā tablete (5 mg) vakarā un 1 supozitorijs (5 mg) ieteicams nākošajā rītā.

Apvalkotās tabletes jānorij veselas (nesakošļājot un nesasmalcinot) pirms gulētiešanas vai pusstundu pirms brokastīm.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiat ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums liekas, ka Bisacodyl Viatris iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Bisacodyl Viatris vairāk nekā noteikts

Caurejas dēļ var būt ievērojams ūdens un elektrolītu (īpaši kālija) zudums. To papildināšana ir simptomātiskās ārstēšanas pamats.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Tas var izraisīt diskomforta sajūtu vēdera apvidū, spastiskas sāpes vēderā, pat līdz zarnu kolikām. Ilgstoša lietošana saasina aizcietējumu, var izraisīt caureju, lielu ūdens un elektrolītu (īpaši kālija) zudumu, kā arī resnās zarnas fizioloģisko funkciju traucējumus.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Bisacodyl Viatris

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiat farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bisacodyl Viatris satur

- Aktīvā viela ir bisakodils 5 mg.
- Citas sastāvdaļas ir kartupeļu ciete, laktoze, talks, magnija stearāts, želatīns, acetilcelulozes ftalāts, polisorbāts 20, saharoze, sarkanā krāsviela (košinila sarkanais), šellaka, Arābijas gumija, bišu vaska un karnauba vaska maisījums.

Bisacodyl Viatris ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā 30 apvalkotās tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Īrija

Ražotājs

ICN Polfa Rzeszów S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2023