

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Olynth 1 mg/ml deguna pilieni, šķīdums**
(Xylometazolini hydrochloridum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 3 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

1. Kas ir Olynth 1 mg/ml un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Olynth 1 mg/ml lietošanas
3. Kā lietot Olynth 1 mg/ml pilienus
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Olynth 1 mg/ml
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Olynth 1 mg/ml un kādam nolūkam to lieto

Olynth 1 mg/ml satur ksilometazolinu, kas palīdz sašaurināt asinsvadus Jūsu deguna dobumā, samazina gļotādas tūsku, kas radusies dažādu iemeslu dēļ, un palīdz Jums elpot vieglāk.

To lieto īslaicīgai deguna aizlikuma un tekoša deguna, kas saistīts ar saaukstēšanos vai sinusītu, ārstēšanai.

2. Kas jāzina pirms Olynth 1 mg/ml lietošanas**Nelietojiet Olynth 1 mg/ml deguna pilienus šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret ksilometazolinu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, īpaši, ja Jums ir šaura leņķa glaukoma,
- ja Jums ir hronisks rinīts (ilgstošu laika periodu deguna gļotādas iekaisums) ar mazu sekrēta daudzumu vai bez tā (*rhinitis sicca*),
- ja Jūs lietojat monoamīnooksidāzes inhibitorus (MAO inhibitori) vai tos lietojāt iepriekšējo 2 nedēļu laikā,
- ja Jūs lietojat citas zāles, kas var paaugstināt asinsspiedienu,
- ja Jums ir iekaisums, kas radies deguna dobuma asinsvadu paaugstinātas jutības dēļ,
- ja Jums ir iekaisums, kas saistīts ar to, ka deguna gļotāda kļūst plānāka, ar vai bez izdalījumiem,
- ja Jums nesen ir bijusi galvas smadzeņu ķirurģiska operācija, kas veikta caur deguna vai mutes dobumu.

Šos pilienus nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Īpaša piesardzība lietošanā

Jautājjiet padomu savam ārstam **pirms** zāļu lietošanas:

- ja Jums ir izteikta reakcija uz simpatomimētiķiem (adrenālīnam līdzīgām zālēm), jo Olynth 1 mg/ml lietošana var radīt bezmiegu, reiboni, trīci, neregulāru sirdsdarbību vai neparastu sirds ritmu, vai paaugstināt asinsspiedienu,
- ja Jums ir sirds slimība (piemēram, pagarināta QT intervāla sindroma), asinsvadu slimības vai augsts asinsspiediens,
- ja Jums ir pastiprināta vairogdziedzera darbība, cukura diabēts vai jebkādi citi vielmaiņas traucējumi,
- ja Jums ir virsnieru dziedzeru slimība,

- ja Jums ir prostatas dziedzeru izmēra palielināšanās (prostatas hipertrofija).

Turpinot lietot pilienus ilgstoši, tas var pastiprināt aizlikta deguna simptomus.

Citas zāles un Olynth 1 mg/ml

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Olynth 1 mg/ml lietošanas.

Nelietojiet šos pilienus, ja Jūs lietojat:

- noteiktus antidepresantus, kā tricikliskos vai tetracikliskos antidepresantus vai MAO inhibitorus vai 2 nedēļas pēc MAO inhibitoru lietošanas (skatīt apakšpunktu „Nelietojiet Olynth 1 mg/ml deguna pilienus šādos gadījumos”);
- citas zāles, kas varētu paaugstināt Jūsu asinsspiedienu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Olynth 1 mg/ml nedrīkst lietot grūtniecības laikā, jo nav pietiekamu pētījumu par zāļu iedarbību uz augli.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nav zināms, vai aktīvā viela nonāk mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Olynth 1 mg/ml nav zināma ietekme uz spējām vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Olynth satur benzalkonija hlorīdu:

Šīs zāles satur 0,2 mg benzalkonija hlorīda katrā ml. Benzalkonija hlorīds var izraisīt deguna gļotādas kairinājumu vai tūsku, it īpaši, ja lieto ilgstoši.

3. Kā lietot Olynth 1 mg/ml pilienus

Pieaugušie un bērni no 12 gadu vecuma

Ja vien ārsts vai farmaceits nav ieteicis citādāk, lietojiet Olynth 1 mg/ml 1-2 pilienus katrā deguna ejā līdz 3 reizēm dienā, **maksimāli līdz 7 dienām ilgi**. Nedrīkst pārsniegt rekomendēto devu.

Lai novērstu infekcijas izplatīšanās risku, katru Olynth 1 mg/ml pudeli nelieto vairāk kā viena persona, un pēc katras lietošanas noskalojiet pilinātāja pipeti.

Pilienus nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Ja esat lietojis Olynth 1 mg/ml vairāk nekā noteikts

Nekavējoties kontaktējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdz šīs zāles vai šo lietošanas instrukciju.

Pārmērīga zāļu deva var izraisīt centrālās nervu sistēmas paralīzi, piemēram, muskuļu funkcijas zudumu, nogurumu, sausumu mutē, svīšanu, paātrinātu, neregulāru sirdsdarbību un paaugstinātu asinsspiedienu.

Ja esat aizmirsis lietot Olynth 1 mg/ml

Ja esat aizmirsis kārtējo devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties, bet, ja ir pienācis laiks nākošajai devai, izlaidiet aizmirsto devu un tālāk lietojiet kā noteikts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī Olynth 1 mg/ml var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

PĀRTRAUCIET lietot pilienus un **nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību**, ja Jums ir jebkurš no sekojošiem simptomiem, kas var būt **alerģiskas reakcijas** pazīme:

- apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums
- smaga ādas nieze ar sarkaniem izsitumiem vai reljefainu uztūkumu.

Citas blakusparādības:

Bieži (ietekmē 1 no 10 lietotājiem):

- Smeldzoša vai dedzinoša sajūta deguna dobumā un rīklē un sausa deguna gļotāda.

Retāk (ietekmē 1 no 100 lietotājiem):

- deguna asiņošana.

Reti (ietekmē 1 no 1000 lietotājiem):

- galvassāpes, paaugstināts asinsspiediens, nervozitāte, slikta dūša, reibonis, bezmiegs un sirdsklauves.
- pārejoši redzes traucējumi un sistēmiskas alerģiskas reakcijas.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt no pieejamajiem datiem):

- deguna gļotādas vai blakusdobumu iekaisuma pastiprināšanās pārtraucot lietot zāles.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Olynth 1 mg/ml

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot ilgāk par 20 nedēļām pēc atvēršanas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Olynth 1 mg/ml deguna pilieni satur

- Aktīvā viela ir ksilometazolīna hidrohlorīds. 1 ml šķīduma satur 1 mg ksilometazolīna hidrohlorīda. 1 pilienis (atbilst 0,05 ml šķīduma) satur 0,05 mg ksilometazolīna hidrohlorīda.
- Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlors, dinātrija edetāts, nātrija hlors, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidroģēnfosfāta dihidrāts, sorbīts (E420), attīrīts ūdens

Olynth 1 mg/ml deguna pilieni ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums, bez smaržas vai neliels raksturīgu smaržu.

10 ml dzintarkrāsas stikla pudele ar uzskrūvējamu pilinātāju (bezkrāsaina, caurspīdīga stikla pilināmā pipete ar gumijas pūslīti).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Office 5, 6 & 7, Block 5
High Street
Tallaght
Dublin 24
D24 YK8N
Īrija

Ražotājs
Delpharm Orleans
5 avenue de Concyr, Orleans Cedex 2,
45071 , Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2023