

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

PEDEKS 5 mg/g gels *Permethrinum*

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabāiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **PEDEKS 5 mg/g gels** un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms **PEDEKS 5 mg/g gela** lietošanas
3. Kā lietot **PEDEKS 5 mg/g gelu**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **PEDEKS 5 mg/g gelu**
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir PEDEKS 5 mg/g gels un kādam nolūkam to lieto

PEDEKS 5 mg/g gela aktīvā viela permetrīns ir arī lietojama viela, kas iedarbojas uz daudziem insektiem, tai skaitā uz utīm visās to attīstības stadijās (gnīdas, kāpuri, kukaiņi). **PEDEKS 5 mg/g gelu** lieto visu veidu utu apkarošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 mēnešu vecuma.

2. Kas Jums jāzina pirms PEDEKS 5 mg/g gela lietošanas

Nelietojiet PEDEKS 5 mg/g gelu šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu permetrīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- bērniem līdz 2 mēnešu vecumam, jo nav pietiekamas pieredzes par lietošanu šajā vecuma grupā.

Īpaša piesardzība, lietojot PEDEKS 5 mg/g gelu, nepieciešama šādos gadījumos

- jāuzmanās, lai gels nenokļūtu acīs. Ja tas noticis, skalot ar lielu daudzumu ūdens;
- bērniem no 2 mēnešu līdz 2 gadu vecumam zāles vēlams lietot medicīnas darbinieku uzraudzībā;
- jāizvairās no zāļu nokļūšanas uz brūcēm un inficētās ādas.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības laikā lietot tikai pēc rūpīgas riska – ieguvuma attiecības izvērtēšanas.
Rūpīgi jāizvērtē gela lietošana barošanas ar krūti laikā – vai nu bērna barošana ar krūti jāpārtrauc vai arī jāatsakās no zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana.

PEDEKS 5 mg/g gels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no PEDEKS 5 mg/g gela sastāvdaļām

Šīs zāles satur 4000 mg alkohola (etilspirta) katrā 40 g tūbā, kas ir līdzvērtīgi 100 mg/g. Tas var izraisīt dedzinošu sajūtu uz bojātas ādas. Gela sastāvā iekļautā palīgviela metilparahidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

3. Kā lietot PEDEKS 5 mg/g gelu

Vienmēr lietojiet **PEDEKS 5 mg/g gelu** tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam.

Nelielu daudzumu gela plānā kārtā ieziež ķermeņa utainajās vietās. Ķermeņa utaino vietu apstrādei nepieciešami 25 līdz 40 g gela. Pēc ieziešanas gelu iztur 40 min, tad nomazgā ar siltu ūdeni un ziepēm vai šampūnu. Beigtās utis un gnīdas izsukā ar biezu suku.

Ja Jums liekas, ka **PEDEKS 5 mg/g gela** iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

PEDEKS 5 mg/g gels paredzēts tikai ārīgai lietošanai! Nelietojiet to iekšķīgi!

Kas jādara, ja Jūs nejauši esat norījis PEDEKS 5 mg/g gelu

Parasti gela norīšana nav bīstama. Tomēr ir vēlama konsultācija ar ārstu.

Ja esat lietojis PEDEKS 5 mg/g gelu vairāk nekā noteikts

Tā kā aktīvā viela permetrīns maz uzsūcas asinīs, maz ticams, ka, lietojot lokāli, zāles var pārdozēt. Tomēr nevar izslēgt noteiktu orgānu sistēmu vai visa organisma ietekmējošu blakusparādību rašanos. Ja tiek pārsniegta ieteicamā deva lietošanai uz ādas, liekais gels jānotīra.

Vienmēr nomazgājiet rokas pēc **Pedeks 5 mg/g gela** lietošanas. Cieši aiztaisiet iepakojumu.

4. Iespējamās PEDEKS 5 mg/g gela blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, arī **PEDEKS 5 mg/g gels** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažos gadījumos iespējama viegli kairinoša iedarbība uz gļotādām, nieze, eritēma, lokāla tūska, izsitumi, dedzinoša sajūta. Tādā gadījumā gela lietošana jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt PEDEKS 5 mg/g gelu

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot **PEDEKS 5 mg/g gelu** pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “Der.līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājjiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko PEDEKS 5 mg/g gels satur

- Aktīvā viela ir perimetrīns. Katrs grams gela satur 5 mg perimetrīna.
- Citas sastāvdaļas ir etilspirts (96%), karbomērs, trolamīns, metilparahidroksibenzoāts (E218), attīrīts ūdens.

PEDEKS 5 mg/g gela ārējais izskats un iepakojums

PEDEKS 5 mg/g gels ir necaurspīdīga gelveida masa no baltas līdz krēmkrāsai. Gels iepakots pa 40 g alumīnija tūbās ar plastmasas vāciņu. Tūbas kopā ar lietošanas instrukciju ievietotas kartona kastītēs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SIA “LMP”,
Vietalvas iela 1, Rīga,
LV-1009, Latvija
info@lmp.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
01.2024