

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Solcoseryl 2,125 mg/10 mg/g pasta lietošanai mutes dobumā *extractum sanguinis, lauromacrogolum 400*

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiat farmaceutam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 10 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Solcoseryl un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Solcoseryl lietošanas
3. Kā lietot Solcoseryl
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Solcoseryl
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Solcoseryl un kādam nolūkam to lieto

Solcoseryl pasta lietošanai mutes dobumā ir zāles, kas domātas:

- sāpīgu, iekaisīgu mutes gļotādas, smaganu un lūpu bojājumu: mutes čūlu (*aftu*), smaganu iekaisumu (*gingivīta, periodontīta*) ārstēšanai,
- protēžu izraisītu čūlu ārstēšanai,
- problēmām, kas saistītas ar zobu šķilšanos.

Ārsts vai farmaceits šīs zāles var ieteikt brūču pārklāšanai pēc ķirurģiskām manipulācijām: zobakmens noņemšanas, periodontālām operācijām, zobu ekstrakcijas, pielaiķojot pagaidu protēzes, alveolīta ārstēšanai.

Solcoseryl pasta lietošanai mutes dobumā satur aktīvo sastāvdaļu - teļa asiņu dializātu, kas uzlabo asinsriti, un lauromakrogolu 400, lai ātri un uz ilgu laiku mazinātu sāpes. Pasta veido pārklājumu, kas ilgstoši piestiprinās pie brūces un aizsargā to no kairinājuma ēšanas un dzeršanas laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms Solcoseryl lietošanas

Nelietojiet Solcoseryl šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jūsu bērns ir jaunāks par 2 gadiem, jo zāļu sastāvā ir piparmētru eļļa un mentols, kas var izraisīt balsenes spazmas un smagus elpošanas traucējumus.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Solcoseryl lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja pasta tiek lietota kā rekomendēts, tad nav nepieciešama speciāla piesardzība. Lūdzu,

informējiet ārstu vai farmaceitu, ja:

- mutes gļotāda vai brūce ir inficēta (apsārtusi, sāpīga),
- Jums ir vēl kāda slimība,
- Jums ir alerģija, vai Jūs lietojat citas zāles (tajā skaitā bezrecepšu zāles) vai kādu ārīgi lietojamo līdzekli.

Akūtas infekcijas gadījumā muti ieteicams skalot arī ar dezinficējošiem šķīdumiem (piemēram, hlorheksidīna diglukonātu).

Ja simptomi ilgst vairāk nekā 10 dienas vai kļūst sliktāk, konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Solcoseryl pasta lietošanai mutes dobumā ir kontrindicēta bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un Solcoseryl

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Solcoseryl drīkst lietot barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Solcoseryl neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Solcoseryl satur parahidroksibenzoātus

Metil-p-hidroksibenzoāts un propil-p-hidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

3. Kā lietot Solcoseryl

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

Ja nav noteikts citādi, izspiediet pastu aptuveni ½ cm garumā un uzklājiet plānu kārtiņu uz brūces 3 – 5 reizes dienā. Īpaši to ieteicams darīt pirms gulētiešanas.

Pastu nedrīkst ierīvēt. Vislabāk to uzklāt, brūci iepriekš nosusinot ar vates tamponu vai tīru pirksta galu. Pēc tam pastu nepieciešams izlīdzināt ar samitrinātu pirksta galu vai izskalot muti ar ūdeni. Tas liks pastai piebriest un izveidot adhezīvu, aizsargājošu plēvīti.

Protēžu radītu čūlu gadījumā pastu uzklāj uz nomazgātas un nosusinātas protēzes. Lai uzlabotu protēzes fiksāciju, pirms tās ielikšanas izskalojiet muti ar ūdeni.

Ārstēšanās ilgums: kamēr brūces ir pilnībā sadzijušas.

Cieši aizveriet tūbiņu pēc lietošanas. Tas neļaus mitrumam piekļūt tūbiņas atverei. Ievērojiet devas, kas norādītas šajā lietošanas instrukcijā, vai kā rekomendējis ārsts. Ja Jūs domājat, ka zāļu efekts ir pārāk mazs vai pārāk liels, lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam

Solcoseryl nedrīkst lietot bērniem jaunākiem par 2 gadiem, jo zāļu sastāvā ir piparmētru eļļa un mentols.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības novērtētas atbilstoši šādai biežuma klasifikācijai:

Ļoti bieži: skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10

Bieži: skar 1 - 10 lietotājus no 100

Retāk: skar 1 - 10 lietotājus no 1 000

Reti: skar 1 - 10 lietotājus no 10 000

Ļoti reti: skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000

Nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Ļoti retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas (hipersensitivitāte), alerģiskas reakcijas, dažkārt ar elpas trūkumu. Šādos gadījumos ārstēšana ar Solcoseryl pastu lietošanai mutes dobumā jāpārtrauc.

Biežums nav zināms:

- bronhospazmas, aizdusa, garšas sajūtas izmaiņas (disgeizija), reakcijas ievadīšanas vietā (piemēram, tūska, apsārtums, jušanas traucējumi, dedzināšanas sajūta).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Solcoseryl

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas pēc "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmreizējas atvēršanas ir 4 nedēļas.

Uzglabāt cieši noslēgtā tūbā, lai pasargātu no mitruma.

Viegli graudaina, sausa Solcoseryl konsistence ir optimālas adhēzijas kritērijs un nemaina tās kvalitāti. Dažkārt pie tūbas atveres vērojamā eļļas atdalīšanās zāļu kvalitāti neietekmē.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiē farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Solcoseryl satur

1 g Solcoseryl satur

aktīvās vielas: 2,125 mg teļa asiņu bezproteīnu dializāta, ķīmiski un bioloģiski standartizēta, 10,0 mg lauromakrogola 400.

Citas palīgvielas ir:

Solcoseryl pamatviela: nātrija karboksimetilceluloze, želatīns, pektīns, polietilēns, šķidrās parafīns.

Konservanti: metil-p-hidroksibenzoāts (E 218), propil-p-hidroksibenzoāts (E 216).

Aromātvielas: piparmētru eļļa un mentols.

Solcoseryl ārējais izskats un iepakojums

Solcoseryl ir viegli iedzeltena, bieza, ar piparmētras garšu un smaržu.

Solcoseryl pieejama 5 g alumīnija tūbās. Katra tūbiņa ir iepakota kartona kastītē kopā ar lietošanas instrukciju.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Viatrix Healthcare Limited

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

DUBLIN

Īrija

Ražotājs

MEDA Pharma GmbH & Co.

KG Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2023