

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Methyluracil STADA 100 mg/g ziede**
methyluracilum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiēt šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiēt farmaceutam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējiēties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 15-30 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Methyluracil STADA un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Methyluracil STADA lietošanas
3. Kā lietot Methyluracil STADA
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Methyluracil STADA
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Methyluracil STADA un kādam nolūkam to lieto

Sadzīšanu veicinošas zāles brūču un čūlu ārstēšanai.

Methyluracil STADA ziede veicina šūnu atjaunošanās procesus, brūču sadzīšanu, epitēlija atjaunošanos, uzrāda pretiekaisuma darbību.

Ziedeī piemīt pozitīva ietekme uz nukleīnskābju maiņas procesiem audos.

Methyluracil STADA pasargā fotodermatīta slimnieku ādu no saules staru ietekmes.

Methyluracil STADA lieto vietēji fotodermatītu (ādas bojājums, kurus izraisa gaismas starojuma iedarbība), brūču, apdegumu (termisku, ķīmisku, starojuma), trofisko čūlu bojāto audu atjaunošanās veicināšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Methyluracil STADA lietošanas**Nelietojiet Methyluracil STADA šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret metiluracilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir akūta vai hroniska leikoze (ļaundabīga asins slimība);
- ja Jums ir limfogranulomatoze (ļaundabīga limfātiskās sistēmas slimība);
- ja Jums ir kaulu smadzeņu ļaundabīga slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Methyluracil STADA lietošanas konsultējiēties ar ārstu vai farmaceitu.

Pēc ziedes lietošanas nomazgāt rokas.

Ja ziede nokļūst acīs, tas jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Citas zāles un Methyluracil STADA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nav ziņots par mijiedarbību ar citām zālēm.

Methyluracil STADA drīkst lietot vienlaicīgi ar sulfanilamīdus (piemēram, streptocīda pulveris), antibiotikas, antiseptiskus līdzekļus (vielas, kas iedarbojas uz mikroorganismiem, kuri atrodas uz ādas un gļotādas) saturošiem ārīgi lietojamiem līdzekļiem.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Risks grūtniecības un barošanas ar krūti laikā, pašlaik nav zināms.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Methyluracil STADA satur lanonlīnu

Lanolīnu var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

3. Kā lietot Methyluracil STADA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien ārsts nav norādījis citādi, Jūs drīkstat lietot Methyluracil STADA, kā norādīts turpmāk.

Ziedi lieto ārīgi katru dienu uzklājot 5-10g uz bojātās ādas 2-3 reizes dienā 15-30 dienas.

Ja esat lietojis Methyluracil STADA vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā konsultējieties ar ārstu vai vērsieties tuvākajā primārās veselības aprūpes iestādē.

Pareizas ziedes lietošanas gadījumā (t.i., ārīgi, saskaņā ar lietošanas instrukciju) ziedi nav iespējams pārdozēt.

Ja esat aizmirsis lietot Methyluracil STADA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Var parādīties sekojoši traucējumi, īpaši gadījumos, kad zāles tiek lietotas nepareizi:
Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem): galvassāpes, alerģiskās reakcijas, nieze.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Methyluracil STADA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 20°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Methyluracil STADA satur:

- Aktīvā viela ir metiluracils.
1 g ziedes satur 100 mg metiluracila.
- Citas sastāvdaļas ir vazelīns, lanolīns un attīrīts ūdens.

Methyluracil STADA ārējais izskats un iepakojums

Iedzeltenas krāsas ziede.

Alumīnija tūbiņas ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.

Ziede ir pieejama 25 g tūbiņās. Tūba ievietota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

Ražotājs

SIA farmaceitiskā firma „ANISS”

Ulbrokas iela 19A, Rīga, Latvija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2023.gada decembrī.