

PACIENTA BRĪDINĀJUMA KARTE

Eliquis (apixaban)

Pacienta brīdinājuma karte

Pastāvīgi nēsājiet šo karti līdz.

Parādiet šo karti savam farmaceitam, zobārstam un jebkuram citam veselības aprūpes speciālistam, kurš Jūs ārstē.

Man parakstīts antikoagulants Eliquis (apixaban), lai novērstu trombu veidošanos.

Aizpildiet šo sadaļu vai palūdziet to izdarīt savam ārstam

Vārds, uzvārds:

Dzimšanas datums:

Indikācija:

Deva: mg divas reizes dienā

Ārsta vārds, uzvārds:

Ārsta telefons:

Informācija pacientam

- Neaizmirstiet regulāri ieņemt Eliquis. Ja aizmirsies ieņemt kārtējo devu, dariet to, tiklīdz atceraties, un turpiniet lietot Eliquis, kā Jums noteikts.
- Nepārtrauciet lietot Eliquis, nekonsultējoties ar ārstu, jo Jums ir risks piedzīvot insultu vai kādu citu komplikāciju.
- Eliquis palīdz šķīdināt asinis. Taču tādēļ Jums var paaugstināties asiņošanas risks.
- Asiņošanas pazīmes ir zilumi vai zemādas asins izplūdumi, darvas krāsas izkārnījumi, asinis urīnā, deguna asiņošana, reibonis, nogurums, bālums vai vājums, pēkšņas stipras galvassāpes, asiņu atklepošana vai atvemšana.
- Ja asiņošana pati neapstājas, **meklējiet medicīnisku palīdzību nekavējoties.**
- Ja Jums nepieciešama operācija, pasakiet ārstējošam ārstam, ka lietojat Eliquis.

Informācija veselības aprūpes speciālistam

- Eliquis (apixaban) ir iekšķīgi lietojams antikoagulants – tiešs, selektīvs Xa faktora inhibitors.
- Eliquis var paaugstināt asiņošanas risku. Spēcīgas asiņošanas gadījumā nekavējoties jāpārtrauc Eliquis lietošana.
- Netiek prasīts Eliquis terapijas laikā regulāri veikt iedarbības kontroli. Kalibrēts kvantitatīvs anti-Xa faktora tests var būt noderīgs īpašās situācijās, piemēram, pie pārdozēšanas vai neatliekamas operācijas (protrombīna laika (PT), starptautiskā standartizētā koeficienta (INR) un aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) testi nav piemēroti) – skatīt Zāļu aprakstu.